

【漢方薬】

# ホノミ<sup>®</sup>ア<sup>°</sup>ン<sup>°</sup>ピ<sup>°</sup>錠

第2類医薬品

◆ ホノミアンピ錠は和剤局方<sup>わだいきょくほう</sup>という書物に書かれている処方をもとにした漢方薬の錠剤です。

## ⚠ 使用上の注意



### 相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
  - 服用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位 | 症 状       |
|------|-----------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ |
  - 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

## \*効能・効果

体力中等度以下で、腹部は力がなくて、胃痛又は腹痛があって、ときに胸やけや、げっぷ、胃もたれ、食欲不振、はきけ、嘔吐などを伴うものの次の諸症：神経性胃炎、慢性胃炎、胃腸虚弱

## 用法・用量

次の量を食間<sup>注</sup>)に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用して下さい。

<sup>注</sup>)「食間」とは食後2～3時間を指します。

| 年 齢       | 1回量     | 1日服用回数 |
|-----------|---------|--------|
| 大 人       | 6錠      | 3回     |
| 7歳以上15歳未満 | 4錠      |        |
| 5歳以上 7歳未満 | 3錠      |        |
| 5歳未満      | 服用しないこと |        |

〈用法・用量に関連する注意〉

- 用法・用量を厳守すること。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

## 成分・分量

本剤18錠(3.6g)中

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| ウイキョウ……0.75g  | } 安中散料水製エキス……0.600g |
| エンゴサク……1.50g  |                     |
| カンゾウ……0.50g   |                     |
| ケイヒ……2.00g    |                     |
| シュクシャ……0.50g  |                     |
| ボレイ……1.50g    |                     |
| リョウキョウ……0.25g |                     |

添加物としてカルメロースカルシウム、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖、メタケイ酸アルミン酸マグネシウムを含有する。

- ・本剤は淡褐色で、特異なにおいを有し、味は初め苦く後甘い素錠です。
- ・本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがありますが、効果に変わりはありません。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 分包品において1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

ホノミアンピ錠は生薬の特性を活かした漢方薬ですので、あなたの体質や病状を考えて正しく服用することが大切です。

あなたの病気を早く治すため、お薬の服用に際しては、漢方薬のことをご理解いただいている医師、薬局・薬店の先生方とよくご相談下さい。

### お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いします。

剂盛堂薬品株式会社 学術部

電話 073(472)3111(代表)

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元



剂盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田二丁目8番31号