

【漢方薬】

# ホノミ<sup>®</sup>キョウキョ錠

◆ ホノミキョウキョ錠は傷寒論<sup>しやうかんろん</sup>という書物に書かれている処方をもとにした漢方薬の錠剤です。

## ⚠ 使用上の注意



### 相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 高齢者。
  - 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
  - 次の症状のある人。  
むくみ
  - 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- 服用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位 | 症 状       |
|------|-----------|
| 消化器  | 悪心・嘔吐     |
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

| 症状の名称     | 症 状                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| 間質性肺炎     | せきを伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。                           |
| 偽アルドステロン症 | 尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。 |
| 肝機能障害     | 全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。                      |

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること

## 効能・効果

体力が弱く、冷え症、貧血気味で、動悸<sup>どうき</sup>、息切れがあり、神経過敏のものの次の諸症：更年期障害、血の道症<sup>a)</sup>、不眠症、神経症

<sup>a)</sup>血の道症：婦人病や女性病のことを示します。

## 用法・用量

次の量を食間<sup>注)</sup>に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用して下さい。

注)「食間」とは食後2～3時間を指します。

|            |         |        |
|------------|---------|--------|
| 年 齢        | 1回量     | 1日服用回数 |
| 大 人        | 6錠      | 3回     |
| 7 歳以上15歳未満 | 4錠      |        |
| 5 歳以上 7歳未満 | 3錠      |        |
| 5歳未満       | 服用しないこと |        |

〈用法・用量に関連する注意〉

- 用法・用量を厳守すること。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

## 成分・分量

本剤18錠(3.6g)中

|       |       |   |              |         |
|-------|-------|---|--------------|---------|
| オウゴン  | 1.5 g | } | 柴胡桂枝乾姜湯水製エキス | 1.430 g |
| カロコン  | 1.5 g |   |              |         |
| カンゾウ  | 1.0 g |   |              |         |
| ケイヒ   | 1.5 g |   |              |         |
| サイコ   | 3.0 g |   |              |         |
| ボレイ   | 1.5 g |   |              |         |
| カンキョウ | 1.0 g |   |              |         |

添加物としてカルメロースカルシウム、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖、メタケイ酸アルミン酸マグネシウムを含有する。

- ・本剤は淡褐色で、特異なおいを有し、味は初め辛く後苦い素錠です。
- ・本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがありますが、効果に変わりはありません。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 分包品において1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

ホノミキョウキョ錠は漢薬の特性を活かした漢方薬ですので、あなたの体質や病状を考えて正しく服用することが大切です。

あなたの病気を早く治すため、お薬の服用に際しては、漢方薬のことをご理解いただいている医師・薬局・薬店の先生方とよくご相談下さい。

### お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記をお願いします。

剂盛堂薬品株式会社 学術部

電話 073(472)3111(代表)

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元



剂盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田515番地1