

【漢方薬】

ホノミ[®]ホ イ オ ー 錠

◆ ホノミホイオー錠^{べんわくろん}は弁惑論という書物に書かれている処方をもとにした漢方薬の錠剤です。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	せきを伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

効能・効果

元気がなく胃腸のはたらきが衰えて疲れやすいものの次の諸症：虚弱体質、疲労倦怠、病後の衰弱、食欲不振、ねあせ

用法・用量

次の量を食間^{注)}に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用して下さい。

^{注)}「食間」とは食後2～3時間を指します。

年 齢	1回量	1日服用回数
大 人	6錠	3回
7歳以上15歳未満	4錠	
5歳以上 7歳未満	3錠	
5歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- 用法・用量を厳守すること。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

*成分・分量

本剤18錠(3.6g)中

オ	ウ	ギ	……	2.0	g	}	補中益気湯エキス(1/2量)……1.7g			
カ	ン	ゾ	ウ	……	0.75			g		
サ	イ	コ	……	0.50	g					
シ	ョ	ウ	キ	ョ	ウ			……	0.25	g
シ	ョ	ウ	マ	……	0.25			g		
タ	イ	ソ	ウ	……	1.0			g		
チ	ン	ピ	……	1.0	g					
ト	ウ	キ	……	1.5	g					
ニ	ン	ジ	ン	……	2.0			g		
ビ	ャ	ク	ジ	ュ	ツ	……	2.0	g		

添加物としてカルメロースカルシウム、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖、メタケイ酸アルミン酸マグネシウムを含有する。

- ・本剤は淡褐色で、特異なにおいを有し、味は苦い素錠です。
- ・本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがありますが、効果に変わりはありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 分包品において1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

ホノミホイオー錠は生薬の特性を活かした漢方薬ですので、あなたの体質や病状を考えて正しく服用することが大切です。

あなたの病気を早く治すため、お薬の服用に際しては、漢方薬のことをご理解いただいている医師・薬局・薬店の先生方とよくご相談下さい。

お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いします。

剂盛堂薬品株式会社 學術部

電話 073(472)3111(代表)

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元



剂盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田515番地1