

この添付文書は、お薬とともに保管し、服用の際には、必ずお読み下さい。

【漢方薬】

フラーリン® A 粒

- ◆ フラーリンA粒は、まんじょうかいしゃん「万病回春」という書物に書かれている処方を基本にした漢方薬の顆粒剤です。水瀉性の下痢・嘔吐・口渴・尿量減少を伴う、食あたり・冷え腹・腹痛などの症状を改善します。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと事故が起こりやすくなる)

次の人は服用しないこと

生後3ヵ月未満の乳児。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 1ヵ月位(急性胃腸炎に服用する場合には5~6回、食あたり、暑気あたりに服用する場合には5~6日間)服用しても症状がよくならない場合

3. 他の医薬品等を併用する場合には、含有成分の重複に注意する必要があるので、医師又は薬剤師に相談すること

機能・効果

水瀉性の下痢^{a)}、嘔吐があり、口渴^{b)}、尿量減少を伴う次の諸症：食あたり、暑気あたり、冷え腹、急性胃腸炎、腹痛

^{a)}水瀉性の下痢：水のような下痢のことと、水様性下痢ともいいます。

^{b)}口渴：口のかわきのことを示します。

用法・用量

次の量を食後に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用して下さい。

年齢	1回量		1日服用回数
	容器入りの場合	分包品の場合	
大人	1.5g(添付のサジ1杯)	1包	3回
7歳以上15歳未満	大人の2/3の量(1.0 g)	2/3包	
4歳以上 7歳未満	大人の1/2の量(0.75 g)	1/2包	
2歳以上 4歳未満	大人の1/3の量(0.5 g)	1/3包	
2歳未満	大人の1/4の量(0.375 g)	1/4包	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (3) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させること。
- (4) 生後3ヵ月未満の乳児には服用させないこと。

成分・分量

本剤4.5g又は3包中

カンゾウ 0.3g · ケイヒ 0.6g · コウボク 0.75g
ショウキョウ 0.45g · ソウジュツ 0.75g · タイソウ 0.45g
タクシャ 0.75g · チヨレイ 0.75g · チンビ 0.75g } 胃苓湯エキス… 0.608g
ビャクジュツ 0.75g · ブクリョウ 0.75g }

カンゾウ末 0.051g、ケイヒ末 0.102g、コウボク末 0.128g、ショウキョウ末 0.077g、
ソウジュツ末 0.128g、タクシャ末 0.128g、チヨレイ末 0.128g、ビャクジュツ末 0.128g、
ブクリョウ末 0.128g、タイソウ末 0.077g、チンビ末 0.128g

添加物として軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖、
ヒドロキシプロピルセルロースを含有する。

- ・本剤は淡褐色で、特異なにおいを有し、味は苦い顆粒です。
- ・本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがあります、効果に変わりはありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 分包品において1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、
2日以内に服用すること。

フラーインA粒は生薬の特性を活かした漢方薬ですので、あなたの体质や病状を考えて正しく服用することが大切です。

あなたの病気を早く治すため、お薬の服用に際しては、漢方薬のことをご理解いただいている医師・薬局・薬店の先生方とよくご相談下さい。

お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、
又は下記にお願いします。

剤盛堂薬品株式会社 学術部

電話 073(472)3111(代表)

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元

 剤盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田515番地1