

【漢方薬】

フラーリン[®] L 粒

第2類医薬品

- ◆ フラーリンL粒は、^{わがいきよくほう}和剤局方という書物に書かれている処方をもとにした漢方薬の顆粒剤です。肩がこり、疲れやすく精神不安などの精神神経症状があったり、便秘の傾向がある場合の冷え症・虚弱体質・月経不順などの症状を改善するように働きます。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

次の人は服用しないこと*

生後3ヵ月未満の乳児。*



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 胃腸の弱い人。
- (4) 高齢者。
- (5) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振

(2) 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合

3. 他の医薬品等を併用する場合には、含有成分の重複に注意する必要があるため、医師又は薬剤師に相談すること

*効能・効果

体力中等度以下で、肩がこり、疲れやすく精神不安などの精神神経症状、ときに便秘の傾向のあるものの次の諸症：冷え症、虚弱体質、月経不順、月経困難、更年期障害、血の道症^{a)}、不眠症、神経症

^{a)}血の道症：月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安や
いらだちなどの精神神経症状および身体症状のことを示します。

*用法・用量

次の量を食後に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用して下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1包	3回
15歳未満7歳以上	2/3包	
7歳未満4歳以上	1/2包	
4歳未満2歳以上	1/3包	
2歳未満	1/4包	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。*
- (3) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させること。*
- (4) 生後3ヵ月未満の乳児には服用させないこと。*

成分・分量

本剤3包(4.5g)中

カンキョウ	0.50g	}	八味逍遙散料エキス	1.2g
カンゾウ	0.75g			
サイコ	1.5 g			
シャクヤク	1.5 g			
トウキ	1.5 g			
ハツカ	0.50g			
ビャクジュツ	1.5 g			
ブクリョウ	1.5 g			

添加物として軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロースを含有する。

- ・本剤は淡褐色で、特異なおおいを有し、味はわずかに苦い顆粒剤です。
- ・本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがありますが、効果に変わりはありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

フラーリンL粒は生薬の特性を活かした漢方薬ですので、あなたの体質や病状を考えて正しく服用することが大切です。
あなたの病気を早く治すため、お薬の服用に際しては、漢方薬のことをご理解いただいている医師、薬局・薬店の先生方とよくご相談下さい。

お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いします。

剂盛堂薬品株式会社 学術部

電話 073(472)3111(代表)

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元



剂盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田二丁目8番31号