

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。

澄明錠 第2類医薬品 漢方製剤 杞菊地黄丸(販売名:澄明錠、内容量:150錠)

⚠ 使用上の注意

👤 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - 医師の治療を受けている人
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - 胃腸が弱く下痢しやすい人
 - 高齢者
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛

- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 他の医薬品等を併用する場合には、含有成分の重複に注意する必要がありますので、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】体力中等度以下で、疲れやすく胃腸障害がなく、尿量減少又は多尿で、ときに手足のほてりや口渴があるものの次の諸症:かすみ目、つかれ目、のぼせ、頭重、めまい、排尿困難、頻尿、むくみ、視力低下

【用法・用量】次の量を食前又は食間^注に、コップ半分以上の水又は白湯で服用してください。

注)「食間」とは食後2～3時間を指します。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	5錠	3回
15歳未満	服用しないこと	

製造番号

使用期限

〈用法・用量に関連する注意〉用法・用量を厳守してください。

【成分・分量】1日量 15錠(5.25g)中(キクカ1.5g・クコシ2.5g・サンシュユ2.0g・サンヤク2.0g・ジオウ4.0g・タクシャ1.5g・ブクリョウ1.5g・ポタンピ1.5g) 杞菊地黄丸料エキス4.3g

添加物として、カルメロースカルシウム、含水二酸化ケイ素、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、ヒドロキシプロピルセルロースを含有します。本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがあります。効果に変わりはありません。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に、チャックをしっかりと閉めて保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 袋の中に乾燥剤を入れています。誤って服用しないよう注意してください。
- 使用期限内であっても、開封後はなるべく早く服用してください。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

お問い合わせ先

☎0120-206-401(平日/10:00～17:00)

発 売 元

株式会社 和漢

福岡県糸島市多久418-7

製造販売元

劑盛堂薬品株式会社

和歌山市太田二丁目8番31号