

この添付文書は本剤とともに大切に保管し、ご使用に際しては必ずお読みください。

第3類医薬品

百草目薬 プラス

御嶽山に古くから伝わり多くの人々に親しまれてきた『百草』は、目薬としても使われていたと言われています。私たちの暮らしの中で、その有効性と安全性から生薬や漢方薬が見直されている今、この『百草目薬プラス』には、抗炎症作用を持つ2つの生薬由来成分が配合されています。

百草目薬プラスは

『百草』の成分である「オウバク」中のベルベリンと「甘草」に含まれるグリチルリチンが炎症を抑え、抗アレルギー作用のあるクロルフェニラミンマレイン酸塩を加えることによって、その効果を高めています。また、コンドロイチン硫酸エステルナトリウムを配合し、疲労した目細胞を速やかに回復させ、更には新陳代謝を促進するビタミンB₆を配合しており、疲れ目、かすみ目を改善し、充血やかゆみ等の症状をやわらげ、眼病予防にも効果のある複合型点眼薬です。



使用上の注意



【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 次の症状のある人
はげしい目の痛み
- (5) 次の診断を受けた人
緑内障

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- (2) 目のかすみ改善されない場合
- (3) 2週間位使用しても症状がよくなる場合

効 能 ・ 効 果

目の疲れ、結膜充血、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ(目やにの多いときなど)

用法・用量、成分・分量、保管及び取扱い上の注意、お問い合わせ先については、裏面をよくご覧ください。

用法・用量

1回2～3滴、1日3～6回点眼してください。

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 定められた用法、用量を守ってください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 容器の先がまぶたやまつ毛などに触れると、目やにや雑菌などのため、薬液が汚染または混濁することがありますので注意してください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (4) ソフトコンタクトレンズの装着液として、また、ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。ソフトコンタクトレンズが変質することがあります。
- (5) 本剤は、点眼用にのみ使用してください。



成分・分量

百草目薬プラスは、100mL中に次の成分を含む黄色澄明の点眼液です。

有効成分	含量(100mL中)	はたらき
ベルベリン硫酸塩水和物	10mg	ふたつの成分の相乗効果により、炎症による目のかゆみ、充血などの症状を改善します。 ヒスタミンの働きを抑え、目のかゆみを鎮めます。 細胞の新陳代謝を促進し、疲れ目を改善します。 角膜を保護し、目にうるおいをあたえるとともに、眼組織の働きを活性化させ、目の疲れを改善します。
グリチルリチン酸二カリウム	150mg	
クロロフェニラミンマレイン酸塩	30mg	
ビリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆)	50mg	
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	250mg	

添加物としてホウ酸、ホウ砂、*l*-メントール、*d*-ボルネオール、エデト酸ナトリウム水和物、グリセリン、クロロブタノール、メチルパラベン、プロピルパラベンを含有しています。

【成分・分量に関連する注意】

本剤を点眼して、ときに口中に甘味を感じることがあります。これは成分の一つであるグリチルリチン酸二カリウムが涙道を通して口中に流れ出てくることによるもので、品質などの異常によるものではありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。また品質の保持のため、自動車内や暖房器具の近くなど、高温の場所(40℃以上)に放置しないでください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります)。
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、開封後はできるだけ速やかに使用してください。
- (6) 本剤の黄色は「ベルベリン」の色です。点眼の際、衣服などにつけないよう、十分にご注意ください。また点眼時、ティッシュを目の下に当ててお使いになることをお勧めします。
- (7) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽く拭き取ってください。

環境問題に配慮し、携帯袋は採用しておりませんので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

お問い合わせ先

佐賀製薬株式会社 お客様相談係

電話：0942-92-5656 受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

発売元 **日野製薬株式会社**
長野県木曽郡木祖村大字敷原1598

製造販売元 **佐賀製薬株式会社**
佐賀県三養基郡基山町小倉481