

第2類医薬品

【販売名】翔雲D

【成分及び分量】成人1日量(50mL)中
 日局 チアミン硝化物……………10mg
 日局 リボフラビンリキスエリナトリウム…2.54mg
 日局 ビリドキシン塩酸塩……………25mg
 日局 ニコチン酸アミド……………20mg
 日局 タウリン……………750mg
 カルニチン塩化物……………100mg
 日局 無水カフェイン……………50mg
 ローカルチンキ-Q(原生薬換算:100mg)…1.00mg
 人參流エキス(原生薬換算:600mg)…0.6mL
 ジャシヨウ流エキス(原生薬換算:300mg)…0.3mL
 イカリ草流エキス(原生薬換算:300mg)…0.3mL
 ゴウチンキ-N(原生薬換算:2mg)…0.2mL
 ロクジョウチンキ-N(原生薬換算:4.2mg)…14.5μL

添加物:精製白糖、スクラロース、ステビア抽出精製物、クエン酸水和物、DL-リンゴ酸、カラメル、安息香酸Na、パラベン、香料、エタノール、バニリン(アルコール0.6mL以下)

- ◆本品に含有されているリボフラビンリン酸エステルナトリウムにより、尿が黄色くなることがあります。
- ◆生薬成分を配合していますので、ときには沈殿を生じる場合がありますが、変質ではありませんからよく振って服用してください。

【保管及び取扱い上の注意】

- ◆直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- ◆小児の手の届かない所に保管すること。
- ◆他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
- ◆使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。



滋養強壮剤 SHOUN 翔雲D

ロクジョウ
ゴオウ
インヨウカク



服用に際しては、説明文書をよく読むこと。

【使用上の注意】 相談すること

次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること。

1. 服用後、次の症状があらわれた場合
皮膚:発疹等
消化器:胃部不快感、下痢等
2. しばらく服用しても症状がよくならない場合

【効能・効果】

- 滋養強壮 ●虚弱体質
- 肉体的疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

【用法・用量】

- 成人(15歳以上)1日1回1瓶(50mL)を服用してください。
 *15歳未満は服用しないこと。
 ◆定められた用法・用量を厳守すること。
 ◆小児には服用させないこと。

お客様相談室

TEL (06) 6131-1300
 (祝祭日を除く月～金 10:00～17:00)

副作用被害救済制度

TEL 0120-149-931

ガラス:瓶
 金属:キャップ



製造販売元
 株式会社 阪本漢法製薬
 大阪市北区曽根崎2丁目7番4号

SHOUN 翔雲D

第2類医薬品



滋養強壮剤 SHOUN 翔雲D

ロクジョウ
ゴオウ
インヨウカク



製造番号

使用期限