

SHOUN 翔雲D

第2類医薬品



滋養強壮

SHOUN 翔雲D

ロクジョウ
ゴオウ
インヨウカク

第2類医薬品



製造番号

使用期限



滋養強壮

SHOUN 翔雲D

ロクジョウ
ゴオウ
インヨウカク

第2類医薬品



成分・分量に関連する注意

- (1)本剤に配合されているリボフラビン酸エステルナトリウムにより、尿が黄色くなる場合があります。
- (2)本剤に配合されている生薬成分により、湿濁又は沈澱を生じることがありますが、品質上問題はありません。よく振ってお飲みください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願致します。

お客様相談室

電話 06-6131-1300
(休祭日を除く月・金曜10:00~17:00)

製造販売元
株式会社 阪本漢法製薬
大阪市北区曽根崎2丁目7番4号

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)



ガラス:瓶
金 属:キャップ

52

服用に際しては、説明文書をよく読むこと

【薬効名】ビタミン含有保健薬

【販売名】翔雲D 第2類医薬品

【使用上の注意】 相談すること

- 1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
関係部位:症状/皮膚:発疹・発赤、かゆみ
消化器:胃部不快感、下痢
- 2.しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

滋養強壮、虚弱体質、肉体的疲労・病中病後・食欲不食・栄養障害、発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

【用法・用量】

成人(15歳以上)1日1回1瓶(50mL)を服用してください。
*15歳未満は服用しないこと。

【用法・用量に関連する注意】

定められた用法・用量を厳守すること。

【成分・分量】成人1日量(50mL)中
日馬チアミン補佐(ビタミンB 補佐剤).....10mg
日馬リボフラビン酸エステルナトリウム(ビタミンB₂リン酸エステル).....2.54mg
日馬ピリドキシン酸(ビタミンB₆).....25mg
日馬ニコチン酸アミド.....20mg
日馬タウリン.....750mg
日馬カルニチン塩化物.....100mg
日馬無水カフェイン.....50mg
ロートゼリーナチン(厚生省基準100mg).....100mg
人参漢エキス(厚生省基準600mg).....0.6mL
シシヨウシ漢エキス(厚生省基準300mg).....0.3mL
イカル漢エキス(厚生省基準300mg).....0.3mL
コウチンキ(厚生省基準2mg).....0.2mL
ロジヨウチンキ(厚生省基準4.2mg).....14.5μL

添加物:精製白糖、スクラロース、ステビア抽出精製物、クエン酸水和物、DL-リンゴ酸、カaramel、安息香酸Na、バラベン、香料、エタノール、パニコリン(エタノール0.6mL以下)