

服用に際しては、説明文書をよく読むこと
【薬効名】ビタミン含有保健薬

【販売名】翔雲A 第2類医薬品

【使用上の注意】

相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	胃部不快感、下痢

2. しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】滋養強壮、虚弱体質、肉
体疲労・病中病後・食欲不振・栄養
障害・発熱性消耗性疾患・産前産後
などの場合の栄養補給

【用法・用量】

成人(15歳以上)1日1回1瓶
(50mL)を服用してください。
※15歳未満は服用しないでください。

【用法・用量に関連する注意】

定められた用法・用量を厳守してく
ださい。

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
[http://www.pmda.go.jp/
kenkouhigai.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html)
電話 0120-149-931
(フリーダイヤル)



ガラス：瓶
金 属：キャップ

S2



滋養強壮
SHOUN

翔雲



第2類医薬品

50mL

【成分・分量】成人1日量(50mL)中
マムシチンキ(原生薬換算：100mg).....0.5mL
ローヤルゼリーチンキ
(粉末原生薬換算：40mg).....100mg
人参流エキス(原生薬換算：600mg).....0.6mL
ジャコウシ流エキス(原生薬換算：300mg).....0.3mL
イカリ草流エキス(原生薬換算：300mg).....0.3mL
ゴウチンキ(原生薬換算：2mg).....0.2mL
ロクジョウチンキ(原生薬換算：4.2mg).....14.5μL
日局 チアミン塩化物(ビタミンB₁ 塩酸塩).....10mg
日局 リボフラビンリン酸エステルナトリウム
(ビタミンB₂リン酸エステル).....2.54mg
日局 ビリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆).....25mg
日局 ニコチン酸アミド.....20mg
日局 タウリン.....750mg
カルニチン塩化物.....100mg
日局 無水カフェイン.....50mg
添加物：白糖、スクラロース、ステビ
ア抽出精製物、クエン酸水和物、DL-
リンゴ酸、カラメル、安息香酸Na、
パラベン、香料(パニリンを含む)、
アルコール(0.8mL以下)を含有

成分・分量に関連する注意

- (1) 本剤に配合されているビタミンB₂リン酸エステルにより、尿が黄色くなることがあります。
- (2) 本剤に配合されている生薬成分により、混濁又は沈殿を生じることがありますが、品質に問題はありません。よく振ってお飲みください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。).
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

【お客様相談室】

電話 06-6131-1300
(祝祭日を除く月～金曜日10:00～17:00)

【製造販売元】

株式会社 阪本漢法製薬
大阪市北区曽根崎2丁目7番4号

SHOUN

翔雲A

第2類医薬品



滋養強壮
SHOUN

翔雲



第2類医薬品

50mL



製造番号

使用期限