

第2類医薬品

ばくもんととう

阪本漢法の麦門冬湯

顆粒

眠くなる成分は入っていません

からぜき、咽喉炎、
しわがれ声、気管支炎、
気管支ぜんそく



有効成分
そのまま!

飲みやすくなりました
(1包あたり3g→2g)

満量処方

日本薬局方 麦門冬湯エキスの
1日最大量27gの生薬から
抽出して得られたエキスを
全量配合した顆粒剤

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 湿気などにより薬が固化する場合がありますので、1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、速やかに服用してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

【お客様相談室】 ☎ 06-6423-0565

(祝日を除く月～金曜日10:00～17:00)

【製造販売元】 株式会社 阪本漢法製薬

兵庫県尼崎市名神町1-5-12

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

顆粒

阪本漢法の
麦門冬湯

ばくもんととう

満量処方

12包

第2類医薬品

眠くなる成分は入っていません

からぜき、咽喉炎、しわがれ声、
気管支炎、気管支ぜんそく



製造番号

使用期限



袋:PE、金属



箱

この箱は本剤とともに保管し、
服用の際にはよくお読みください。

漢方製剤

第2類医薬品

【販売名】 阪本漢法の麦門冬湯顆粒

【効能・効果】

体力中等度以下で、たんが切れにくく、ときに強くせきこみ、
又は咽喉の乾燥感があるものの次の諸症：からぜき、
気管支炎、気管支ぜんそく、咽喉炎、しわがれ声

【用法・用量】

1日3回食前又は食間に水かお湯で服用してください。

年 齢	1回量	服用回数
成人 (15歳以上)	1包	1日3回
7歳以上 15歳未満	2/3包	
4歳以上 7歳未満	1/2包	
2歳以上 4歳未満	1/3包	
2歳未満	1/4包	

※食間とは食後 2～3 時間を指します。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

【成分・分量】

成人1日量3包 (1包2.0g) 中 日局 麦門冬湯エキス 4.4g

成 分	分量	成 分	分量
日局 バクモンドウ	10g	日局 タイソウ	3g
日局 ハンゲ	5g	日局 ニンジン	2g
日局 コウベ	5g	日局 カンゾウ	2g

より製した乾燥エキス

添加物：乳糖水和物、結晶セルロース、軽質無水ケイ酸、
ステアリン酸マグネシウム

※本剤は天然物(生薬)のエキスをを用いていますので、
顆粒の色調等が多少異なることがあります。

押して開ける

△使用上の注意

⊗【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の人は服用しないこと 生後3ヵ月未満の乳児

⊗【相談すること】

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人 (5) 次の症状のある人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (6) 次の診断を受けた人
(3) 水様性の痰の多い人 (4) 高齢者
(4) 高血圧、心臓病、胃臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・ 息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急に あらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、 脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、 褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位(からぜきに服用する場合には1週間位)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること