

服用前にこの添付文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

漢方製剤

第2類医薬品

ま おう とう

# 阪本漢法の麻黄湯顆粒

## ■製品の特徴

- 「麻黄湯」は、漢方の原典といわれる中国の医書「傷寒論」<sup>しょうかんろん</sup>に記載されている処方です。
- さむけや発熱があり、せきが出て身体の不ふしぶしが痛く、汗が出ていない方の感冒に効果があります。



## 使用上の注意



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください  
体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
2. 短期間の服用にとどめ、連用しないでください



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3) 胃腸の弱い人。  
(4) 発汗傾向の著しい人。  
(5) 高齢者。  
(6) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。  
(7) 次の症状のある人。  
むくみ、排尿困難  
(8) 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、食欲不振、胃部不快感
そ の 他	発汗過多、全身脱力感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、 脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 1ヵ月位(感冒、鼻かぜに服用する場合には5～6回)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## ■効能・効果

体力充実して、かぜのひきはじめて、さむけがして発熱、頭痛があり、せきが出て身体のふしぶしが痛く汗が出ていないものの次の諸症：感冒、鼻かぜ、気管支炎、鼻づまり

## ■用法・用量

1日3回食前又は食間に水かお湯で服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人(15歳以上)	1 包	3 回
7歳以上 15歳未満	2 / 3 包	
4歳以上 7歳未満	1 / 2 包	
4歳未満	服用しないでください	

\*食間とは食後2～3時間を指します。

### <用法・用量に関連する注意>

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2)定められた用法・用量を厳守してください。

## ■成分・分量

成人1日量3包(1包3g)中

日局 麻黄湯エキス 1.92g

成 分	分 量
日局 マオウ	5g
日局 キョウニン	5g
日局 ケイヒ	4g
日局 カンゾウ	1.5g

より製した乾燥エキス

添加物：乳糖水和物、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム

### <成分・分量に関連する注意>

本剤は天然物(生薬)のエキスを用いていますので、顆粒の色調等が多少異なることがあります。

## ■保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)湿気などにより薬が固化することがありますので、1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、速やかに服用してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

お客様相談室

電話 06-6423-0565 (祝日を除く月～金曜日 10:00～17:00)

製造販売元



株式  
会社

阪本漢法製薬

兵庫県尼崎市名神町1-5-12