

第3類医薬品

QuaLife

# 肌あれ いぼに

クオリフ  
ヨクイニン錠

生薬製剤

第3類医薬品

QuaLife

# 肌あれ いぼに

クオリフ  
ヨクイニン錠

生薬製剤

日本薬局方 ヨクイニン18gから  
抽出して得られたエキスと  
ヨクイニン末0.5gを配合した錠剤

28日分 336錠

【成分・分量】

成人1日量(12錠)中

成分	分量
ヨクイニンエキス (日局 ヨクイニン 18000 mgより抽出)	1384.6 mg
日局 ヨクイニン末	500 mg

添加物:バレイショデンプン、乳糖水和物、メタケイ酸アルミン酸Mg、無水ケイ酸、クロスCMC-Na、ステアリン酸Mg

<成分・分量に関連する注意>

本剤は天然物(生薬)を用いていますので、錠剤の色調等が多少異なることがあります。また、錠剤の表面に黒褐色の斑点が見られることがあります。これはヨクイニンによるものです。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) ぬれた手で取り扱わないでください。また、ビンから錠剤を取り出した後は、キャップをしっかり締めて保管してください。(湿気は錠剤の色や形が変わる原因になります。)
- (5) ビンの中の詰め物は輸送時の破損防止用なので、開封時に捨ててください。(詰め物を再びビンに入ると湿気を含み品質が変わる原因になります。)
- (6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

お客様相談室

☎ 06-6423-0565  
(祝日を除く月～金曜日10:00～17:00)

【製造販売元】

株式会社 阪本漢法製薬  
兵庫県尼崎市名神町1-5-12

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

第3類医薬品

QuaLife

# 肌あれ いぼに

クオリフ  
ヨクイニン錠

生薬製剤

日本薬局方 ヨクイニン18gから  
抽出して得られたエキスと  
ヨクイニン末0.5gを配合した錠剤

28日分 336錠

服用前にこの箱の説明書を必ずお読みください。また、添付文書は挿入していませんので、必要ときに読めるよう、この箱を大切に保管してください。

生薬製剤

第3類医薬品

【販売名】クオリフ ヨクイニン錠

△使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
(1) 医師の治療を受けている人  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人  
(3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。 下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】いぼ、皮膚のあれ

【用法・用量】1日3回食前又は食間に水かお湯で服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	4錠	3回 ※食間とは食後2～3時間を指します。
5歳以上 15歳未満	2錠	
5歳未満	服用しないでください	

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 定められた用法・用量を厳守してください。

①



4 987076 606304

製造番号

使用期限

S1  
BB07