

第2類医薬品

ま お う
麻 黄 湯
顆 粒

満量
処方

第2類医薬品

ま お う
麻 黄 湯
顆 粒

満量
処方

日本薬局方 麻黄湯エキスの1日最大量
15.5gの生薬から抽出して得られたエキス
を全量配合した顆粒剤

第2類医薬品

ま お う
麻 黄 湯
顆 粒

満量
処方

顆粒
42包

日本薬局方 麻黄湯エキスの1日最大量
15.5gの生薬から抽出して得られた
エキスを全量配合した顆粒剤

眠くなる成分は入っていません

体力充実して、かぜのひきはじめて、頭痛や
せきがあり、汗が出ていない方の

ふしぶしの痛み、発熱、
さむけのある感冒、鼻かぜに

【用法・用量】

1日3回食前又は食間に水かお湯で服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1 包	3回
7歳以上 15歳未満	2/3 包	
4歳以上 7歳未満	1/2 包	
4歳未満	服用しないでください	

※食間とは食後2～3時間を指します。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2)定められた用法・用量を厳守してください。

【成分・分量】

成人1日量3包(1包3g)中 日局 麻黄湯エキス 1.92g

成 分	分 量
日局 マオウ	5 g
日局 キョウニン	5 g
日局 ケイヒ	4 g
日局 カンゾウ	1.5 g

より製した乾燥エキス

添加物：乳糖水和物、結晶セルロース、
ステアリン酸マグネシウム

＜成分・分量に関連する注意＞

本剤は天然物(生薬)のエキスを用いていますので、
顆粒の色調等が多少異なることがあります。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)湿気などにより薬が固化することがありますので、
1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、速やかに服用してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

【お客様相談室】 ☎06-6423-0565

(祝日を除く月～金曜日10:00～17:00)

【製造販売元】



株式
会社

阪本漢法製薬

兵庫県尼崎市名神町1-5-12

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

押して開ける

漢方製剤

第2類医薬品

服用前にこの箱の説明文書を必ずお読みください。また、添付文書は挿入して
おりませんので、必要ときに読めるよう、この箱を大切に保管してください。

【販売名】サカンボー麻黄湯顆粒

【特 徴】

- 「麻黄湯」は、体力が充実して、かぜのひきはじめて、頭痛やせきがあり、
汗が出ていない方のふしぶしの痛み、発熱、さむけのある感冒などの症状を改善するための処方です。
- 本剤は「麻黄湯」の1日最大量の生薬より抽出したエキスを配合した
満量処方で、飲みやすく服用量を調節しやすい顆粒です。
- 本剤は眠くなる成分を含みませんので、仕事や車の運転にも支障はありません。

△使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください
体の虚弱な人 (体力の衰えている人、体の弱い人)
2. 短期間の服用にとどめ、連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人(2)妊婦又は妊娠していると思われる人(3)胃腸の弱い人(4)発汗傾向の著しい人(5)高齢者(6)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
(7)次の症状のある人：むくみ、排尿困難(8)次の診断を受けた人：
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、
直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感
その他	発汗過多、全身脱力感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに
医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、 脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 1ヵ月位(感冒、鼻かぜに服用する場合には5～6回)服用しても
症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、
薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】体力充実して、かぜのひきはじめて、さむけがして発熱、頭痛
があり、せきが出て身体のふしぶしが痛く汗が出ていないものの次の諸症：感冒、鼻かぜ、気管支炎、鼻づまり

S1



袋・PE、金属



箱



4 987076 626470

製造番号

使用期限