

服用前にこの袋の説明文書を必ずお読みください。

切り口

吸湿しやすいため、服用のつどチャックをしっかりと閉めください。

【販売名】阪本漢法の葛根湯錠

漢方製剤 第2類医薬品



相談すること

△ 使用上の注意

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人) (4) 胃腸の弱い人 (5) 発汗傾向の著しい人 (6) 高齢者 (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人 (8) 次の症状のある人:むくみ、排尿困難 (9) 次の診断を受けた人:高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】体力中等度以上のものの次の諸症:感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

【用法・用量】1日3回、食前又は食間に水又は白湯で服用してください。

年 齢	1回量
成人(15歳以上)	6錠
7歳以上 15歳未満	4錠
5歳以上 7歳未満	3錠
5歳未満	服用しないこと

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 用法・用量を厳守してください。
- (3) 食間とは食後2~3時間を持します。

【成分・分量】成人1日量18錠中 日局 葛根湯エキス 4.34g(カッコン8.0g、マオウ4.0g、タイソウ4.0g、ケイビ3.0g、シャクヤク3.0g、カンゾウ2.0g、ショウキョウ1.0gより抽出)、添加物:ヒドロキシプロピルセルロース、メタケイ酸アルミニウムMg、無水ケイ酸、クロスCMC-Na、ステアリン酸Mg、タルク、カルナウバロウ
※本剤は天然物(生薬)のエキスを用いていますので、錠剤の色調等が多少異なることがあります。

【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になります)品質が変わります。(4)ぬれた手で取り扱わないでください。(湿気は錠剤の色や形が変わる原因になります。)(5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。(6)開封後はなるべく早く使用してください。

【お客様相談室】 ☎ 06-6423-0565

(祝日を除く月~金曜日10:00~17:00)

【製造販売元】 株式会社 阪本漢法製薬
兵庫県尼崎市名神町1-5-12

製造番号

使用期限



副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931