五苓散（ごれいさん）

満量処方

第2類医薬品

顆粒15包

【用法・用量】
1日3回食前又は食間に水かお湯で服用してください。

年　齢	1回量	服用回数
成人（15歳以上）	1 包	1日3回
7歳以上　15歳未満	2／3 包	
4歳以上　7歳未満	1／2 包	
2歳以上　4歳未満	1／3 包	
2歳未満	服用しないこと	

※食間とは食後 2～3 時間を指します。

<用法・用量に関連する注意>
小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】
成人1日量3包(1包1g)中　日局 五苓散エキス1.69g

成　分	分量	成　分	分量
日局 タクシャ	5g	日局 ビャクジュツ	3g
日局 チョレイ	3g	日局 ケイヒ	2g
日局 プクリョウ	3g	より製した乾燥エキス	

添加物：乳糖水和物、結晶セルロース、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム

※本剤は天然物（生薬）のエキスを用いていますので、顆粒の色調等が多少異なることがあります。

【保管及び取扱い上の注意】
(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。
(3) 他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わります。）
(4) 1包を分割した残りを服用する時は、袋の口を折り返して保管し、速やかに服用してください。

低気圧など天気による不快を感じる方

頭痛・むくみ

五苓散（ごれいさん）
満量処方
顆粒15包

体力に関わらず使用でき、のどが渇いて尿量が少ないもので、めまい、はきけ、嘔吐、腹痛、頭痛、むくみなどのいずれかを伴う方に

第2類医薬品

4 987076 626579

製造番号

使用期限

プラ
袋：PE、金属

紙
箱

この箱は本剤とともに保管し、服用の際にはよくお読みください。

漢方製剤
第2類医薬品

【販売名】 阪本漢法の五苓散エキス顆粒

⚠使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症　状
皮　膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 1ヵ月位（急性胃腸炎、二日酔に服用する場合には5～6回、水様性下痢、暑気あたりに服用する場合には5～6日間）服用しても症状が良くならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【お客様相談室】 ☎ 06-6423-0565
（祝日を除く月～金曜日10:00～17:00）

【製造販売元】
株式会社 阪本漢法製藥
兵庫県尼崎市名神町1－5－12

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

S1

押して開ける

真夏日などの暑気あたり

急性胃腸炎・水様性下痢に

五苓散（ごれいさん）
満量処方
顆粒15包

【効能・効果】
体力に関わらず使用でき、のどが渇いて尿量が少ないもので、めまい、はきけ、嘔吐、腹痛、頭痛、むくみなどのいずれかを伴う次の諸症：水様性下痢、急性胃腸炎（しぶり腹のものには使用しないこと）、暑気あたり、頭痛、むくみ、二日酔

<効能又は効果に関連する注意>
しぶり腹とは、残便感があり、くり返し腹痛を伴う便意を催すもののことである

第2類医薬品