

この箱は本剤とともに保管し、
服用の際にはよくお読みください。

漢方製剤
第2類医薬品

【販売名】 阪本漢法の五苓散エキス顆粒

△使用上の注意

△相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- 1ヵ月位（急性胃腸炎、二日酔に服用する場合には5～6回、水様性下痢、暑気あたり）に服用する場合には5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【お客様相談室】 ☎ 06-6423-0565
(祝日を除く月～金曜日10:00～17:00)

【製造販売元】

株式会社 阪本漢法製薬
兵庫県尼崎市名神町1-5-12

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931



差し込み口

真夏日などの
暑気あたり

急性胃腸炎・
水様性下痢に



ご れ い さ ん
五 苓 散
満量処方
顆粒15包

【効能・効果】

体力に関わらず使用でき、のどが渇いて尿量が少ないもので、めまい、はきけ、嘔吐、腹痛、頭痛、むくみなどのいずれかを伴う次の諸症：水様性下痢、急性胃腸炎（しづり腹のものには使用しないこと）、暑気あたり、頭痛、むくみ、二日酔
＜効能又は効果に関連する注意＞
しづり腹とは、残便感があり、くり返し腹痛を伴う
便意を催すもののことである

第2類医薬品

【用法・用量】

1日3回食前又は食間に水かお湯で服用してください。

年 齢	1回量	服用回数
成人（15歳以上）	1包	1日3回
7歳以上 15歳未満	2/3包	
4歳以上 7歳未満	1/2包	
2歳以上 4歳未満	1/3包	
2歳未満	服用しないこと	

※食間とは食後 2～3 時間を指します。

＜用法・用量に関連する注意＞

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】

成人1日量3包(1包1g)中 日局 五苓散エキス1.69g

成 分	分量	成 分	分量
日局 タクシャ	5g	日局 ビャクジュツ	3g
日局 チョレイ	3g	日局 ケイヒ	2g
日局 ブクリョウ	3g	より製した乾燥エキス	

添加物：乳糖水和物、結晶セルロース、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム

※本剤は天然物（生薬）のエキスを using していますので、顆粒の色調等が多少異なることがあります。

【保管及び取扱上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 1包を分割した残りを服用する時は、袋の口を折り返して保管し、速やかに服用してください。



満量処方

開け口

ご れ い さ ん
五 苓 散
満量処方

第2類医薬品

顆粒15包

低気圧など
天気による
不快を感じる方

む 頭
く 痛
み

ご れ い さ ん
五 苓 散
満量処方
顆粒15包



体力に関わらず使用でき、のどが渇いて尿量が少ないもので、めまい、はきけ、嘔吐、腹痛、頭痛、むくみなどのいずれかを伴う方に

第2類医薬品



4 987076 626579

製造番号

使用期限



袋：PE、金属



紙

箱

●

S2