



はん げ こう ぼく とう
半夏厚朴湯
顆粒

第2類医薬品

満量
処方

15包

第2類医薬品

ストレスなどによる

のどのつかえ感

不安神経症、神経性胃炎

ストレスなどによる

のどのつかえ感

不安神経症、神経性胃炎

満量
処方

はん げ こう ぼく とう
半夏厚朴湯
顆粒

15包

第2類医薬品

服用しやすい顆粒タイプ

満量
処方

服用しやすい
顆粒タイプ

はん げ こう ぼく とう
半夏厚朴湯
顆粒

15包

【お客様相談室】 ☎ 06-6423-0565
(祝日を除く月～金曜日10:00～17:00)

【製造販売元】 株式会社 阪本漢法製薬
兵庫県尼崎市名神町1-5-12

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

**不安神経症、神経性胃炎、つわり、
せき、しわがれ声、のどのつかえ感**



4 987076 627477

製造番号

使用期限



袋:PE、金属



箱

S1

【効能・効果】

体力中等度をめやすとして、気分がふさいで、咽喉・食道部に異物感があり、ときに動悸、めまい、嘔気などを伴う次の諸症:不安神経症、神経性胃炎、つわり、せき、しわがれ声、のどのつかえ感

【用法・用量】

1日3回、食前又は食間に水又は白湯で服用してください。

年 齢	1回量	服用回数
成人(15歳以上)	1包	1日3回
7歳以上 15歳未満	2/3包	
4歳以上 7歳未満	1/2包	
2歳以上 4歳未満	1/3包	
2歳未満	1/4包	

※食間とは食後2～3時間を指します。

<用法・用量に関連する注意>

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2)1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。
- (3)定められた用法・用量を厳守してください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)湿気などにより薬が固化することがありますので、1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、速やかに服用してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

押して開ける

この箱は本剤とともに保管し、服用の際にはよくお読みください。

漢方製剤

【販売名】 阪本漢法の半夏厚朴湯顆粒

第2類医薬品

△使用上の注意

⊗してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の人は服用しないでください 生後3ヵ月未満の乳児

※相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人
(2)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 1ヵ月位(つわりに服用する場合には5～6日間)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【成分・分量】 成人1日量3包(1包1.0g)中 日局 半夏厚朴湯エキス1.53g

成 分	分量	成 分	分量
日局 ハンゲ	6g	日局 ソヨウ	2g
日局 フクリョウ	5g	日局 ショウキョウ	1g
日局 コウボク	3g	より製した乾燥エキス	

添加物:乳糖水和物、結晶セルロース、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム

※本剤は天然物(生薬)のエキスをを用いていますので、顆粒の色調等が多少異なることがあります。