

はち み じ お う が ん じ ょ う

八味地黄丸錠

22日分
396錠



第2類医薬品

第2類医薬品

八味地黄丸錠

はち み じ お う が ん じ ょ う

夜間尿・軽い尿漏れ
頻尿・残尿感に

22日分
396錠



8種の生薬が効く!〔満量処方〕

頻尿、軽い尿漏れ、
残尿感、夜間尿、
排尿困難に

第2類医薬品

頻尿 残尿感

夜間尿・軽い尿漏れ



22日分 396錠

八味地黄丸錠

はち み じ お う が ん じ ょ う

8種の生薬が効く!〔満量処方〕

頻尿、軽い尿漏れ、
残尿感、夜間尿、
排尿困難に

【用法・用量】

1日3回、食前又は食間に水又は白湯で服用してください。

年 齢	1 回 量	服用回数
成人（15歳以上）	6錠	1日3回
7歳以上 15歳未満	4錠	
5歳以上 7歳未満	3錠	
5歳未満	服用しないでください	

※食間とは食後2～3時間を指します。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 定められた用法・用量を厳守してください。

【成分・分量】

成人1日量18錠中 日局 八味地黄丸エキス 4.4g

成 分	分量	成 分	分量	成 分	分量
日局 ジオウ	5g	日局 タクシャ	3g	日局 ケイヒ	1g
日局 サンシュユ	3g	日局 ブクリョウ	3g	日局 プシ末	1g
日局 サンヤク	3g	日局 ボタンビ	3g	より製した乾燥エキス	

添加物：メタケイ酸アルミン酸Mg、軽質無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスCMC-Na、ステアリン酸Mg

<成分・分量に関連する注意>

本剤は天然物(生薬)のエキスをうんでいますので、錠剤の色調等が多少異なることがあります。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) めれた手で取り扱わないでください。
(湿気は錠剤の色や形が変わる原因になります。)
- (5) ビンの中の詰め物は開封時に捨ててください。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

【お客様相談室】

☎ 06-6423-0565
(祝日を除く月～金曜日10:00～17:00)

【製造販売元】

株式会社 阪本漢法製薬
兵庫県尼崎市名神町1-5-1 2

押して開ける



この箱は本剤とともに保管し、服用の際にはよくお読みください。

漢方製剤

【販売名】 サカンボー八味地黄丸錠

第2類医薬品

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の人は服用しないでください
(1) 胃腸の弱い人 (2) 下痢しやすい人



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人
(4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- | 関係部位 | 症 状 |
|------|-----------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 食欲不振、胃部不快感、腹痛 |
| その他 | 動悸、のぼせ、口唇・舌のしびれ |
3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 下痢
 4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく、尿量減少又は多尿で、ときに口渴があるものの次の諸症：下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、残尿感、夜間尿、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善(肩こり、頭重、耳鳴り)、軽い尿漏れ

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931



4 987076 615641

製造番号

使用期限