

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

外皮用殺菌消毒剤

プッシュ綿棒GO.05

PUSH SWAB GO.05

区 分	医薬品
承認番号	22000APX00011000
販売開始	2008年2月

特 長

プッシュ綿棒GO.05は綿棒と外皮殺菌消毒剤である0.05%クロルヘキシジングルコン酸塩液を別ポケットに包装して滅菌処理した製品です

使用前に綿棒を薬液ポケットに“プッシュ”することにより0.05%クロルヘキシジングルコン酸塩液を含ませ、使用できます

衛生的：個包装で使い切りタイプです

綿棒の軸部分に0.05%クロルヘキシジングルコン酸塩液がつきません

滅菌製剤です

消毒に適した薬液量：1回分が包装されており無駄がありません

携帯に便利：個包装ですので携帯に適しております



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

次の人は使用しないこと

- （1）本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人
- （2）患部が広範囲の人
- （3）深い傷やひどいやけどの人



相談すること

1、次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること

- （1）医師の治療を受けている人
- （2）本人又は家族がアレルギー体質の人
- （3）薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人

2、次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

（1）使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症 状
ショック（アナフィラキシー）	使用后すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。

（2）5～6日間使用しても症状がよくなる場合

効能又は効果


すり傷、きり傷、かき傷、さし傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒

用法及び用量

1日数回患部に塗布してください

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること
- (2) 目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと
なお、症状が重い場合は、眼科医の診療を受けること
- (3) 外用にのみ使用すること

取扱い方法



STEP1：綿棒を押さえるように持つ

STEP2：↓の方向に押し込む

STEP3：薬液の逆端から→の方向に引っ張り開封する

STEP4：綿棒を取り出す

STEP5：皮膚上に塗布する

成分

プッシュ綿棒G0.05の液は、100mL中に下記の成分を含有する

有効成分	日本薬局方クロロヘキシジングルコン酸塩液（20%）	0.25mL
------	---------------------------	--------

保管及び取扱い上の注意

使用期限 2年（包装等に記載）

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）
- (4) 衣服等に付着するとわずかに着色しますのでご注意ください。なお付着した場合にはすぐに水でよく洗い落としてください
- (5) 開封後はすみやかに使用すること

包装

プッシュ綿棒G0.05	No.12	1本入	1.5mL
プッシュ綿棒G0.05	No.12	2本入	3.0mL
プッシュ綿棒G0.05	No.13	1本入	5.0mL

本品についてのお問合せ先

- お買い求めのお店
- お客様窓口（フリーダイヤル 0120-50-0451）

ハクゾウホームページでも商品内容を紹介しております。
URL <http://www.hakuzo.co.jp/>

製造販売元 ハクゾウメディカル株式会社
大阪市中央区本町橋3番6号