

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

外皮用殺菌消毒剤

プッシュ綿棒P
PUSH SWAB P

第3類医薬品

区 分	第3類医薬品
承認番号	21700APZ01119000
販売開始	2006年1月

特 長

プッシュ綿棒Pは綿棒と外皮用殺菌消毒剤である10%ポビドンヨード液を別ポケットにて包装した製品です

使用前に綿棒を薬液ポケットに“プッシュ”することにより10%ポビドンヨード液を含ませ、使用できます

衛生的：個包装で使い切りタイプです

綿棒の軸部分に10%ポビドンヨード液がつきません

消毒に適した薬液量：1回分が包装されており無駄がありません

携帯に便利：個包装ですので携帯に適しております

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる）

次の人は使用しないこと

- （1）本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- （2）患部が広範囲の人。
- （3）深い傷やひどいやけどの人。



相談すること

1、次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること

- （1）医師の治療を受けている人
- （2）本人又は家族がアレルギー体質の人
- （3）薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人

2、次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

（1）使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック （アナフィラキシー）	使用后すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。

（2）5～6日間使用しても症状がよくなる場合

効能又は効果


切り傷、さし傷、すりむき傷、靴ずれ、やけどなどの患部の殺菌・消毒。
とびひ、おできなどの感染皮膚面の殺菌・消毒

■ 用法及び用量

1日数回患部に塗布してください

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること
- (2) 目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。
なお、症状が重い場合は、眼科医の診療を受けること
- (3) 外用にのみ使用すること

取扱い方法



- STEP1：綿棒を押さえるように持つ。
STEP2：↓の方向に押し込む。
STEP3：薬液の逆端から↺↻の方向に引っ張り開封する。
STEP4：綿棒を取り出す。
STEP5：皮膚上に塗布する。

■ 成 分

プッシュ綿棒Pの液は、1mL中に下記の成分を含有する。

有効成分	ポビドンヨード	100mg（有効ヨウ素として10mg）
添加物	ラウロマクロゴール	

■ 保管及び取扱い上の注意

使用期限 2年（包装等に記載）

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）
- (4) 衣服等に付着すると着色しますのでご注意ください。なお付着した場合にはすぐに水でよく洗い落としてください
- (5) 開封後はすみやかに使用すること

■ 包 装

プッシュ綿棒P	No.12	1本入（1.5mL）	24袋
プッシュ綿棒P	No.12	2本入（3.0mL）	24袋
プッシュ綿棒P	No.13	1本入（5.0mL）	24袋

本品についてのお問合せ先

- お買い求めのお店
- お客様窓口 ☎0120-50-0451（受付時間 9:00～17:00 ※土・日・祝日・当社休業日を除く）

ハクゾウホームページでも商品内容を紹介しております。
URL <http://www.hakuzo.co.jp/>

* 〔製造販売元〕



ハクゾウメディカル株式会社
大阪市中央区徳井町2丁目4番9号