

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

外皮用殺菌消毒剤

プッシュ綿棒PF

PUSH SWAB PF

区 分	医薬品
承認番号	21900APX00375000
販売開始	2007年5月

特 長

プッシュ綿棒PFは綿棒と外皮用殺菌消毒剤である10%ポビドンヨード液を別ポケットにて包装した製品です

使用前に綿棒を薬液ポケットに“プッシュ”することにより10%ポビドンヨード液を含ませ、使用できます。エタノールを含有しているので速乾性です

衛生的：個包装で使い切りタイプです

綿棒の軸部分に10%ポビドンヨード液がつきません

消毒に適した薬液量：1回分が包装されており無駄がありません

携帯に便利：個包装ですので携帯に適しております



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

次の人は使用しないこと

- （1）本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- （2）患部が広範囲の人。深い傷やひどいやけどの人。（エタノールを含有するため刺激作用を有する。）



相談すること

1、次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること

- （1）医師の治療を受けている人
- （2）本人又は家族がアレルギー体質の人
- （3）薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人

2、次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

（1）使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック（アナフィラキシー）	使用后すぐにじんましん、浮腫、胸痛しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。

（2）5～6日間使用しても症状がよくならない場合

効能又は効果


切り傷、さし傷、すりむき傷、靴ずれ、やけどなどの患部の殺菌・消毒。
とびひ、おできなどの感染皮膚面の殺菌・消毒

用法及び用量

1日数回患部に塗布してください

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること
- (2) 目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。
なお、症状が重い場合は、眼科医の診療を受けること
- (3) 外用にのみ使用すること

取扱い方法



STEP1：綿棒を押さえるように持つ。

STEP2：↓の方向に押し込む。

STEP3：薬液の逆端から→の方向に引っ張り開封する。

STEP4：綿棒を取り出す。

STEP5：皮膚上に塗布する。

成分

プッシュ綿棒PFの液は、1mL中に下記の成分を含有する。

有効成分	ポビドンヨード	100mg（有効ヨウ素として10mg）
添加物	エタノール、グリセリン、ラウロマクロゴール	

保管及び取扱い上の注意

使用期限 2年（包装等に記載）

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）
- (4) 衣服等に付着すると着色しますのでご注意ください。なお付着した場合にはすぐに水でよく洗い落としてください
- (5) 開封後はすみやかに使用すること

包装

プッシュ綿棒PF	No.12	1本入	1.5mL
プッシュ綿棒PF	No.12	2本入	3.0mL
プッシュ綿棒PF	No.13	1本入	5.0mL

本品についてのお問合せ先

- お買い求めのお店
- お客様窓口（フリーダイヤル 0120-50-0451）

ハクゾウホームページでも商品内容を紹介しております。
URL <http://www.hakuzo.co.jp/>

発売元 ハクゾウメディカル株式会社
大阪市中央区本町橋3番6号
製造販売元 ハクゾウメディカルテクノス株式会社
熊本県菊池市七城町流川205