

2012年5月 記載要領変更に伴う改訂

第2類
医薬品

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。



ビタミン含有保健薬

滋養強壮

ユンケル[®]
黄帝液

40



使用上の注意

相談すること

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

[効能]

滋養強壮

肉体疲労・病中病後・発熱性消耗性疾患・食欲不振・栄養障害・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

虚弱体質

[用法・用量]

年 齢	1回服用量	1日服用回数
大人(15才以上)	1瓶(40mL)	1回
15才未満	服用しないでください	

<用法・用量に関連する注意>

定められた用法・用量を厳守してください。

[成分・分量と働き] 1瓶(40mL)中

成 分	分 量	働 き	
反鼻チンキ	133mg	マムシの皮と内臓を除いて乾燥させたもの	それぞれの生葉から抽出されたもので、滋養強壮、肉体疲労・発熱性消耗性疾患時の栄養補給に効果をあらわします。
シベットチンキ	333mg	ジャコウネコの腺分泌物	
ニンジン流工キス	600mg	オタネニンジンの根	
西洋サンザン乾燥工キス	30mg	西洋サンザンの花	
ジオウ乾燥工キス	120mg	アカヤジオウの根	
ローヤルゼリー	133mg	ミツバチの咽頭腺でつくられる乳状物で、滋養強壮に効果をあらわします。	

成 分	分 量	働 き
ビタミンB1硝酸塩	10mg	
ビタミンB2リン酸エステル	10mg	
ビタミンB6	10mg	
ビタミンB12	50μg	
ビタミンE酢酸エステル	10mg	
ニコチン酸アミド	25mg	
パンテノール	10mg	
コンドロイチン硫酸 エステルナトリウム	120mg	滋養強壮に効果をあらわします。
無水カフェイン	50mg	中枢神経に働いて効果をあらわします。

添加物として、安息香酸Na、dl-リンゴ酸、白糖、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、パラベン、カラメル、pH調整剤、香料、グリセリン、アルコール(1.2mL以下)を含有します。



● 人参

オタネニンジンの根を薬用とします。サポニンが主成分で、滋養強壮、虚弱体質に効果をあらわします。



● 西洋サンザシ

フラボノイドを含有し、滋養強壮、肉体疲労時の栄養補給に効果をあらわします。



● 地黄

アカヤジオウの根。滋養強壮、肉体疲労時の栄養補給に効果をあらわします。



● ローヤルゼリー

ミツバチの咽頭腺でつくられる乳状物で、アミノ酸、ビタミンを含み、滋養強壮、肉体疲労時の栄養補給に効果をあらわします。

〈成分・分量に関連する注意〉

- 本剤はビタミンB2リン酸エステルを含有するため、本剤の服用により、尿が黄色くなることがあります。
- 本剤は生薬エキスを配合していますので、わずかに濁りを生じることがあります。

◎ 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。

ストローの添付を終了させていただきました。

(そのまま服用されても効果は変わりません。)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口

電話 03(5412)7393

受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元

佐藤製薬株式会社

東京都港区元赤坂1丁目5番27号

