

第3類
医薬品ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。

ビタミンB₁₂主葉製剤
ユンケル[®]
B12
アクティブα
 メコバラミン&コンドロイチン配合

ユンケルB12アクティブαは…

- 末梢神経の機能を整えて、神経痛、腰痛、手足のしびれに効果をあらわすメコバラミン(活性型ビタミンB₁₂)を配合しています。
- 天然型ビタミンEを配合して、末梢の血行を促進することにより、肩こり、腰痛、手足のしびれに効果をあらわします。
- 軟骨組織中に存在し、弾力性や保水性を与える役割をするコンドロイチン硫酸エステルナトリウムを配合しています。



使用上の注意



相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

| 関係部位 | 症 状 |
|-------|----------------|
| 皮 膚 | 発疹 |
| 消 化 器 | 食欲不振、吐き気、胃部不快感 |



2. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

下痢、便秘

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

〔効能〕

次の諸症状の緩和：

腰痛、手足のしびれ(しびれ感)、神経痛、肩・首すじのこり

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」

〔用法・用量〕

下記の1回服用量を食後に服用します。

| 年 齢 | 1回服用量 | 1日服用回数 |
|-----------|------------|--------|
| 成人(15才以上) | 2錠 | 3回 |
| 15才未満 | 服用しないでください | |

〈用法・用量に関する注意〉

定められた用法・用量を厳守してください。

〔成分・分量と働き〕 6錠中

| 成 分 | 分 量 | 働き |
|-------------------------------------|-------|--|
| メコバラミン (活性型ビタミンB ₁₂) | 1.5mg | 末梢神経の機能を整えて、神経痛、腰痛、手足のしびれに効果をあらわします。 |
| コンドロイチン 硫酸エステルナトリウム | 900mg | 軟骨組織中に存在し、弾力性や保水性を与える役割をしています。 |
| L-アスパラギン酸 マグネシウム・カリウム | 200mg | 神経・筋肉の機能を高め、代謝を活発にします。 |
| 酢酸d-α-トコフェロール (天然型ビタミンE) | 10mg | 末梢の血行を促進することにより、肩こり、腰痛、手足のしびれに効果をあらわします。 |

添加物として、二酸化ケイ素、ヒドロキシプロピルセルロース、D-マンニトール、ステアリン酸Mg、グルコサミン塩酸塩、ヒプロメロース、タルク、酸化チタン、三二酸化鉄を含有します。

◎保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。(本剤は光に対して不安定です。)
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4)使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。
- (5)湿気により、変色や亀裂など品質に影響を与える場合がありますので、
下記のことご注意ください。
 - 服用のつどキャップをよくしめてください。
 - ぬれた手で触れないでください。
 - 開封後は、湿気を含むおそれがありますので、瓶の中の詰め物を捨ててください。(詰め物は輸送時、錠剤の破損を防ぐために入れてあります)



副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの
お店又は下記にお願い申し上げます。
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口
電話 03(5412)7393
受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元
佐藤製薬株式会社
東京都港区元赤坂1丁目5番27号