

成分及び分量 1包中

アセトアミノフェン	300mg
エテンザミド	500mg
プロモバレルリル尿素	200mg
無水カフェイン	60mg
添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、パレイシヨデンブ、ステアリン酸Mg、ケイヒを含有する。	

用法及び用量

大人（15歳以上）	1回1包
11歳以上15歳未満	1回1/2包
7歳以上11歳未満	1回1/3包
3歳以上7歳未満	1回1/4包
1歳以上3歳未満	1回1/8包
1日2回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用してください。服用間隔は、6時間以上おいてください。（1歳未満は服用しないでください）	

製造販売元 佐藤薬品工業株式会社
奈良県橿原市観音寺町9番地の2



効能又は効果

- 1) 頭痛・歯痛・拔牙後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛
- 2) 悪寒・発熱時の解熱

注意

1. 次の人は服用しないでください。
(1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
2. 服用後、薬物又は機械類の運転操作をしないでください。
3. 服用に際しては、添付の使用上の注意書をよくお読みください。
4. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
5. 小児の手の届かない所に保管してください。
6. 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
7. 配置期限を過ぎた製品は使用しないでください。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

2包 (1包1.2g入) ￥200

品目番号 奈良2巻44-145

配置期限

製造番号

90F⑤



第2類医薬品

おたふく
のり

おたふくのり・おたふくのり

おたふくのり

おたふくのり

ご使用に際して、この注意書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

解熱鎮痛薬の使用上の注意

△ 使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

- 次の人は服用しないでください。
(1)本剤による過敏症状(発疹・発赤、かゆみ、浮腫等)を起こしたことがある人。
(2)本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。
他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔い薬
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
(眠気があらわれることがあります。)
- 服用時は飲酒しないでください。
- 長期連用しないでください。

相談すること

- 次の人は服用前に医師、歯科医師又は薬剤師にご相談ください。
(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)水痘、水ぼうそう、若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15歳未満)。
(4)高齢者。
(5)本人又は家族がアレルギー体質の人。
(6)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(7)次の診断を受けた人。
心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍

裏面もお読みください

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師にご相談ください。

(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、やけど様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄だん(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。
ぜんそく	

(2)5～6回服用しても症状がよくならない場合

用法及び用量に関連する注意

- (1)定められた用法及び用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5)配置期限を過ぎた製品は使用しないでください。

解熱鎮痛薬 小

20 G ①