

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。


第2類医薬品

胃粘膜修復剤 MMSC 100mg・アカメガシワ配合

生薬配合

クミアイ新胃腸薬M錠

クミアイ新胃腸薬M錠は、
ストレスの多い生活環境や、
肉や脂肪類の多い食生活からくる
胃腸の負担を改善する、
右のような
特長をもって
おります。



メチルメチオニンスルホニウム
クロライド (MMSC) は、胃の
粘膜に直接働き、荒れた胃を修
復します。

胃もたれの原因である脂肪の消
化を促進させるために、脂肪消
化酵素のリパーゼAP6を配合
しています。

バイオアスターゼ2000と相
まって、胃腸の負担を軽くし、すっ
きりとした食後感が期待できます。

ナトリウム・フリータイプですから、減
塩を心掛けていらっしゃる方にも安心です。



使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください。
透析療法を受けている人。
2. 長期連用しないでください。

相談すること



1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください。

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4)次の診断を受けた人。

腎臓病

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。

- (1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2)2週間位服用しても症状がよくなりえない場合

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、
服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。

下痢

裏面もお読みください

効能又は効果

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部膨満感、胃もたれ、胃重、胸つかえ、げっぷ、はきけ（胃のむかつき、二日酔・悪酔いのむかつき）、嘔吐、飲み過ぎ、食べすぎ、胃痛、食欲不振、消化不良による胃部・腹部膨満感、消化不良、消化促進

用法及び用量

次の量を食後に水又はぬるま湯で服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
大人（15歳以上）	3 錠	3 回
11歳～14歳	2 錠	
8 歳～10歳	1.5錠	
5 歳～7 歳	1 錠	
乳幼児（5 歳未満）	服用しないこと	

＜用法及び用量に関連する注意＞

- (1)定められた用法及び用量を守ってください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分及び分量

9 錠中

成 分	含 量	は た ら き
メチルメチオニンスルホニウムクロライド (MMSC)	100mg	荒れた胃粘膜を修復するとともに保護します。
合成ヒドロタルサイト	1500mg	過剰の胃酸を中和して、不快な過酸症状を改善します。
ビオザアスターゼ2000	100mg	炭水化物、蛋白質、脂肪の消化を助けます。
リパーゼAP6	60mg	脂肪の消化を助けます。
アカメガシワ（赤芽柏）	150mg	荒れた胃の粘膜に作用し、保護します。
ケイヒ末（桂皮末）	240mg	低下した胃腸の働きを活発にし、消化液の分泌を促して消化
ソヨウ（蘇葉）	100mg	機能を整えます。

添加物としてトウモロコシデンプン、硬化油、ショ糖脂肪酸エステル、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Ca、l-メントールを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)配置期限を過ぎた製品は使用しないでください。

問い合わせ先

- 1)本製品の購入先
- 2)佐藤薬品工業株式会社 医薬情報室
TEL 0744-28-0021
受付時間 9：00～16：30（土・日・祝日を除く）

発 売 元  北海道厚生農業協同組合連合会
札幌市中央区北4条西1-1

製造販売元  佐藤薬品工業株式会社
奈良県橿原市観音寺町9番地の2