

この説明書は、ご使用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

第3類医薬品

皮膚炎・しつしん・かぶれ [皮膚疾患治療剤]

コナ[®]軟膏

皮膚炎やしつしんは皮膚病の中で最も一般的にみられるもので、体質的な原因によって起こるもの、刺激性の物質に触れたとき起こるものなどがあります。これらはいずれも痒みを伴い、かきこわしを起こしやすいので、炎症を抑え痒みを鎮めることが大切です。

コナ軟膏は、炎症を抑え痒みを鎮めるジフェンヒドラミン塩酸塩、dl-カンフル、皮膚の血行を促進させるトコフェロール酢酸エステル（ビタミンEアセテート）、皮膚の代謝機能を改善するビタミンA油、かきこわしによる化膿を防ぐイソプロピルメチルフェノールを含み、皮膚炎、しつしん、かぶれ、ひび、あかぎれ等に効果を示します。また本剤は皮膚になじみやすい乳剤性軟膏基剤ですから、有効成分の皮膚への浸透性がすぐれています。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 湿潤やただれのひどい人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ

- (2) 5~6日間使用しても症状の改善がみられない場合。

効能・効果

皮膚炎、しつしん、じんましん、ただれ、かぶれ、しもやけ、ひび、あかぎれ

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布または塗擦してください。

(裏面につづく)

[用法・用量に関する注意]

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用のみに使用してください。

■成分と働き■

100g中に次の成分を含んでいます。


成 分	含量	働き
トコフェロール酢酸エステル	2g	血行を促進し、患部の回復を早めます。
ジフェンヒドラミン塩酸塩	0.5g	炎症と痒みを抑えます。
dl-カンフル	3g	緩和な鎮痒効果と清涼感があります。
イソプロピルメチルフェノール	0.1g	かきこわしによる化膿を防ぎます。
ビタミンA油 (ビタミンA50万単位／g)	1g	皮膚の代謝を改善し、荒れをなめらかにします。

(乳剤性軟膏基剤)

添加物としてオリーブ油、パルミチン酸セチル、精製ラノリン、濃グリセリン、ステアリルアルコール、ラウロマクロゴール、ポリオキシエチレンセチルエーテル、コレステロール、ステアリン酸ポリエチレングリコール、ステアリン酸グリセリン、ミリスチン酸イソプロピルを含んでいます。

■保管及び取扱い上の注意■

- (1) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (2) 直射日光の当たらない、涼しい所に密栓して保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するために、他の容器に入れかえないでください。
- (4) 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。



副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

お問い合わせ先

本剤のご使用により、何か変わった症状があらわれるなど、お気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

ノーエチ薬品株式会社 お客様相談室 電話 072-331-0417

月～金曜日 AM9:00～PM5:00 (土・日・祝日は除く)

発 売 元

ノーエチ 薬品株式会社
大阪府松原市高見の里4丁目8番16号



製 造 販 売 元

三宝製薬株式会社
東京都新宿区下落合2-3-18