

ご使用に際し、この説明文書（台紙）を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

20mL

鎮痒消炎剤

ケスラクール液

第2類医薬品

！ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3) 湿潤やただれのひどい人。
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

- 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

効能・効果 かゆみ、虫さされ

用法・用量 1日数回、適量を患部に塗布してください

〈用法・用量に関連する注意〉(1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください (2)目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください (3)本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください (4)定められた用法・用量を守ってください ※長期間使用しない場合など、塗布栓のボールに付着した液が固まる場合がありますので、その場合はティッシュペーパー等でふいてからご使用ください。

成分・分量(100mL中)

ジフェンヒドラミン塩酸塩 2.0g リドカイン 0.5g
ℓ-メントール 3.0g dl-カンフル 2.0g
添加物：クエン酸水和物、ヒドロキシプロピルセルロース、エタノール、アジピン酸ジイソプロピル、ハアセチルしょ糖、アンモニア

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください (2)小児の手が届かない所に保管してください (3)他の容器に入れかえないでください(誤用の原因になり品質が変わることがあります) (4)火気に近づけないでください (5)メガネ、時計、アクセサリなどの金属類、化繊の衣類、プラスチック類、床や家具などの塗装面等に付着すると変質することがありますので、付着しないよう注意してください (6)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください ※外装フィルムは、容器右側のミシン目に沿って開封してください。

製造販売元

三友薬品株式会社
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号

◆お問い合わせ先◆

お客様相談窓口 03-3899-9333



台紙



外装フィルム



副作用被害救済制度

電話：0120-149-931

A

※製造番号・使用期限は容器底面に記載