

サンワ いん ちん こう とう 茵陳蒿湯 エキス細粒「分包」

サンワ茵陳蒿湯エキス細粒「分包」は、漢方処方「茵陳蒿湯」の水製エキスを服用しやすい細粒剤の分包にしたものです。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
他の瀉下薬（下剤）
- * 2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - * (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
 - * (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
* 消化器	悪心・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

＊＊まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
肝 機 能 障 害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。

- (2) 1週間位服用しても症状がよくなる場合

- * 3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること
下 痢

用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人（15才以上）	1 包
7才～14才	2/3 包
4才～ 6才	1/2 包

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成 分

本品1日量 …… [3包（1包2g）] 中
茵陳蒿湯水製エキス …… 1.2g

インチンコウ	4g
サンシシ	3g
ダイオウ	1g

添加物として乳糖、トウモロコシデンプンを含有する。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社
TEL 03-3834-2171

適応症

口渇があり、尿量少なく、便秘するものの次の諸症：
じんましん、口内炎



三和生薬株式会社
宇都宮市平出工業団地6-1