

サンワ おう ぎ けん ちゅう とう 黄耆建中湯 エキス細粒「分包」

サンワ黄耆建中湯エキス細粒「分包」は、漢方処方「黄耆建中湯」の水製エキスを服用しやすい細粒剤の分包にしたものです。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。
むくみ
 - 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病

- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- 1ヶ月位服用しても症状がよくなりません

- 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること

成 分

本品 1 日量 …………… [3 包 (1 包 2 g)] 中
黄耆建中湯水製エキス …… 2.3 g

ケ イ ヒ……………	2.4 g
ショウキョウ……………	0.6 g
タイソウ……………	2.4 g
シャクヤク……………	3.6 g
カンゾウ……………	1.2 g
オ ウ ギ……………	2.4 g

添加物として乳糖、トウモロコシデンプンを含有する。

保管及び取り扱い上の注意

- 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社
TEL 03-3834-2171 (代)

適応症

身体虚弱で疲労しやすいものの次の諸症：
虚弱体質、病後の衰弱、ねあせ。

用法・用量

次の 1 回量を 1 日 3 回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人 (1 5 才以上)	1 包
7 才 ~ 1 4 才	2/3 包
4 才 ~ 6 才	1/2 包

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。



三 和 生 薬 株 式 会 社
宇都宮市平出工業団地 6 - 1