

ご使用に際しては、説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるように保管して下さい。



JPS 漢方細粒－91号

漢方製剤

品名 サンワ黄耆建中湯エキス細粒「分包」

本剤は、漢方処方「黄耆建中湯」の水製エキスを服用しやすい細粒剤の分包にしたものです。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。

むくみ

- (6) 次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、腎臓病

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起ることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- (2) 1ヶ月位服用しても症状がよくなりません

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること

〔効能・効果〕

身体虚弱で疲労し易いものの次の諸症：

虚弱体質、病後の衰弱、ねあせ。

〔用法・用量〕

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人(15才以上)	1 包
7才以上15才未満	2/3包
4才以上7才未満	1/2包
4才未満	服用しないこと

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

〔成分・分量〕

本品1日量……………〔3包(1包2g)〕中

黄耆建中湯水製エキス……………2.3g

ケ イ ヒ……………	2.4g
ショウキョウ……………	0.6g
タイソウ……………	2.4g
シャクヤク……………	3.6g
カンゾウ……………	1.2g
オ ウ ギ……………	2.4g

添加物として、乳糖、トウモロコシデンプンを含有する。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社
TEL03-3834-2171(代)

発 売 元 ジェーピーエス製薬株式会社
横浜市都筑区東山田4-42-22
製造販売元 三 和 生 薬 株 式 会 社
宇都宮市平出工業団地6-1