

ご使用に際しては、説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるように保管して下さい。

サンワ かつこんとうかせんきゅうしんい 葛根湯加川芎辛夷 エキス細粒「分包」

サンワ葛根湯加川芎辛夷エキス細粒「分包」は、漢方処方「葛根湯加川芎辛夷」の水製エキスを服用しやすい細粒剤の分包にしたものです。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

* (3) 体の虚弱な人 (体力の衰えている人, 体の弱い人)。

* (4) 胃腸の弱い人。

* (5) 発汗傾向の著しい人。

(6) 高齡者。

(7) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

* (8) 次の症状のある人。

むくみ, 排尿困難

*** (9) 次の診断を受けた人。**

高血壓，心臟病，腎臟病，甲狀腺機能障害

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消 化 器	悪心，食欲不振，胃部不快感
皮 膚	発疹・発赤，かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する，顔や手足がむくむ，まぶたが重くなる，手がこわばる，血圧が高くなる，頭痛等があらわれる。

(2) 1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること

成分

本品1日量 [3包 (1包 2g)] 中

葛根湯加川芎辛夷水製エキス …………… 2.4 g

カッコン…………	2.4 g	ショウキョウ…………	0.6 g
マ オ ウ…………	2.4 g	カンゾウ…………	1.2 g
ケ イ ヒ…………	1.2 g	センキュウ…………	1.8 g
シャクヤク…………	1.2 g	シ ン イ…………	1.8 g
タイソウ…………	1.8 g		

添加物として乳糖、トウモロコシデンプン含有する。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店
または下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社
TEL 03-3834-2171

適応症

鼻づまり、蓄膿症、慢性鼻炎

用法·用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人 (15才以上)	1 包
7才~14才	2/3 包
4才~6才	1/2 包

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。



三和生薬株式会社
宇都宮市平出工業団地6-1