

か みしょうようさん
サンワ 加味逍遙散 エキス細粒

サンワ加味逍遙散エキス細粒は、漢方処方「加味逍遙散」の水製エキスを服用しやすい細粒剤にしたものです。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - * (3) 胃腸の弱い人。
 - (4) 高齢者。
 - (5) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - (6) 次の症状のある人。
むくみ
 - (7) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。
＊＊肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。

- (2) 1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること

- * 4. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること
下 痢

用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人（15才以上）	2.0 g
15才 未 満	服用しないこと

成 分

本品1日量 6 g 中
加味逍遙散水製エキス 2.1 g

トウキ.....	1.8 g	カンゾウ.....	1.2 g
シャクヤク.....	1.8 g	ボタンビ.....	1.2 g
ビャクジュツ...	1.8 g	サンシシ.....	1.2 g
ブクリョウ.....	1.8 g	ショウキョウ...	0.6 g
サイコ.....	1.8 g	ハ ッ カ.....	0.6 g

添加物として乳糖、トウモロコシデンプンを含有する。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社
TEL 03-3834-2171（代）

適応症

体質虚弱な婦人で、肩がこり、疲れやすく、精神不安などの精神神経症状、ときに便秘の傾向のある次の諸症：
冷え症、虚弱体質、月経不順、月経困難、更年期障害、
血の道症



三和生薬株式会社
宇都宮市平出工業団地6-1