

か みしょうようさん  
サンワ 加味逍遙散 エキス錠

サンワ加味逍遙散エキス錠は、漢方処方「加味逍遙散」の水製エキスを服用しやすい錠剤にしたものです。



### 使用上の注意



#### 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 胃腸の弱い人。
- (4) 高齢者。
- (5) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (6) 次の症状のある人。  
むくみ
- (7) 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病

#### 2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位  | 症 状              |
|-------|------------------|
| 皮 膚   | 発疹・発赤、かゆみ        |
| 消 化 器 | 悪心・嘔吐、食欲不振、胃部不快感 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。  
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

| 症 状 の 名 称 | 症 状                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| 偽アルドステロン症 | 尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。 |
| 肝 機 能 障 害 | 全身のだるさ、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）等があらわれる。                      |

- (2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなりません

#### 3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること

#### 4. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること

下痢

### 用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用すること。

| 年 令       | 1 回 量   |
|-----------|---------|
| 大人（15才以上） | 6 錠     |
| 15才未満     | 服用しないこと |

### 成 分

本品1日量 …… 18錠（1錠 0.3g）中  
加味逍遙散エキス（3/5量） …… 2.1g

|                |                |
|----------------|----------------|
| トウキ …… 1.8g    | カンゾウ …… 1.2g   |
| シャクヤク …… 1.8g  | ボタンヒ …… 1.2g   |
| ビャクジュツ …… 1.8g | サンシシ …… 1.2g   |
| ブクリョウ …… 1.8g  | ショウキョウ …… 0.6g |
| サイコ …… 1.8g    | ハッカ …… 0.6g    |

添加物として乳糖、トウモロコシデンプン、メタケイ酸アルミン酸Mg、ステアリン酸Ca、カルメロースCa、セルロースを含有する。

### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

### ● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社  
TEL 03-3834-2171（代）

### 適応症

体力中等度以下で、のぼせ感があり、肩がこり、疲れやすく、精神不安やいらだちなどの精神神経症状、ときに便秘の傾向のあるものの次の諸症：

冷え症、虚弱体質、月経不順、月経困難、更年期障害、血の道症等、不眠症

（適応症に関連する注意）

注：血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。



三和生薬株式会社  
宇都宮市平出工業団地6-1

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果にはかわりございません。