

ご使用に際しては、説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるように保管して下さい。

サンワ かん ぞう とう 甘草湯 エキス細粒「分包」

サンワ甘草湯エキス細粒「分包」は、漢方処方「甘草湯」の水製エキスを服用しやすい細粒剤の分包にしたものです。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

＊短期間の服用にとどめ、連用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 次の症状のある人。
むくみ
- (5) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1) まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

＊(2) 5～6回服用しても症状がよくならない場合

成 分

本品 1 日量 …… [2 包 (1 包 1 g)] 中
甘草湯水製エキス …… 0.9 g
[カンゾウ …… 4.0 g]

添加物として乳糖、トウモロコシデンプン、アルファー化デンプン、ステアリン酸 Ca、カルボキシメチルセルロース Ca、軽質無水ケイ酸を含有する。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社

TEL 03-3834-2171

適応症

激しい咳、咽喉痛の緩解

用法・用量

次の 1 回量を 1 日 2 回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人 (1 5 才以上)	1 包
7 才 ～ 1 4 才	2/3 包
4 才 ～ 6 才	1/2 包
2 才 ～ 3 才	1/3 包

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。



三 和 生 薬 株 式 会 社
宇都宮市平出工業団地 6 - 1