

ご使用に際しては、説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるように保管して下さい。

けいがいれんぎょうとう

サンワ 荊芥連翹湯 エキス細粒

サンワ 荊芥連翹湯エキス細粒は、漢方処方「荊芥連翹湯」の水製エキスを服用しやすい細粒剤にしたものです。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

* (3) 胃腸の弱い人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
* 消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
* 肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。

- (2) 1 ヶ月位服用しても症状がよくならない場合

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

適応症

蓄膿症，慢性鼻炎，慢性扁桃炎，にきび

用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人（15才以上）	2.0 g
7才～14才	1.3 g
4才～6才	1.0 g

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成 分

本品1日量 …………… 6 g 中

荊芥連翹湯水製エキス … 1.9 g

トウキ…………	0.9 g	キジツ…………	0.9 g
シャクヤク…………	0.9 g	オウゴン…………	0.9 g
ケイガイ…………	0.9 g	サンシシ…………	0.9 g
レンギョウ…………	0.9 g	ビャクシ…………	0.9 g
ハマボウフウ…	0.9 g	キキョウ…………	0.9 g
センキュウ…………	0.9 g	カンゾウ…………	0.6 g
サイコ…………	0.9 g		

添加物として乳糖，トウモロコシデンプンを含有する。

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社
TEL 03-3834-2171



三和生薬株式会社
宇都宮市平出工業団地6-1