

サンワ けいがいいんぎょうとう 荊芥連翹湯 エキス細粒「分包」

サンワ荊芥連翹湯エキス細粒「分包」は、漢方処方「荊芥連翹湯」の水製エキスを服用しやすい細粒の分包にしたものです。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 胃腸の弱い人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
＊ 間 質 性 肺 炎	せきを伴い、息切れ、呼吸困難、 発熱等があらわれる。
肝 機 能 障 害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目 が黄色くなる）等があらわれる。

- (2) 1 ヶ月位服用しても症状がよくなる場合

成 分

本品 1 日量 …………… 3 包（1 包 2 g） 中
荊芥連翹湯水製エキス …… 1.9 g

ト ウ キ…………… 0.9 g	キ ジ ツ…………… 0.9 g
シャクヤク………… 0.9 g	オウゴン…………… 0.9 g
ケイガイ…………… 0.9 g	サンシシ…………… 0.9 g
レンギョウ………… 0.9 g	ビャクシ…………… 0.9 g
ハマボウフウ… 0.9 g	キキョウ…………… 0.9 g
センキュウ………… 0.9 g	カンゾウ…………… 0.6 g
サ イ コ…………… 0.9 g	

添加物として乳糖，トウモロコシデンプンを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

適応症

体力中等度以上で、皮膚の色が浅黒く、ときに手足の裏に脂汗をかきやすく腹壁が緊張しているものの次の諸症：
蓄膿症（副鼻腔炎）、慢性鼻炎、慢性扁桃炎、にきび

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社
TEL 03-3834-2171（代）

用法・用量

次の 1 回量を 1 日 3 回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人（15 才以上）	1 包
7 才～14 才	2/3 包
4 才～ 6 才	1/2 包
4 才 未 満	服用しないこと

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果にはかわりございません。



三 和 生 薬 株 式 会 社
宇都宮市平出工業団地 6－1