

ご使用に際しては、説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるように保管して下さい。

けいがいれんぎょうとう
サンワ 荊芥連翹湯 エキス錠

サンワ荊芥連翹湯エキス錠は、漢方処方「荊芥連翹湯」の水製エキスを服用しやすい錠剤にしたものです。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

＊(3) 胃腸の弱い人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
＊皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
＊肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。

- (2) 1 ヶ月位服用しても症状がよくならない場合

成 分

本品 1 日量 ……………〔18 錠（1 錠 0.3 g）〕 中
荊芥連翹湯水製エキス …………… 1.9 g

ト ウ キ………… 0.9 g	キ ジ ツ………… 0.9 g
シャクヤク………… 0.9 g	オウゴン………… 0.9 g
ケイガイ………… 0.9 g	サンシシ………… 0.9 g
レンギョウ………… 0.9 g	ビャクシ………… 0.9 g
ハマボウフウ… 0.9 g	キキョウ………… 0.9 g
センキュウ………… 0.9 g	カンゾウ………… 0.6 g
サ イ コ………… 0.9 g	

添加物として乳糖、トウモロコシデンプン、ステアリン酸 Ca、メタケイ酸アルミン酸 Mg を含有する。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

適応症

蓄膿症、慢性鼻炎、慢性扁桃炎、にきび

用法・用量

次の 1 回量を 1 日 3 回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人（15 才以上）	6 錠
7 才～14 才	4 錠
5 才～ 6 才	3 錠
5 才 未 満	服用しないこと

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社
TEL 03-3834-2171（代）



三 和 生 薬 株 式 会 社
宇都宮市平出工業団地 6－1