

けい し か しゃくやくとう
サンワ 桂枝加芍薬湯 エキス細粒「分包」

サンワ桂枝加芍薬湯エキス細粒「分包」は、漢方処方「桂枝加芍薬湯」の水製エキスを服用しやすい細粒剤の分包にしたものです。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。
むくみ
- (6) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

(2) 1 週間位服用しても症状がよくならない場合

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること

成 分

本品 1 日量 …… [3 包 (1 包 2 g)] 中
桂枝加芍薬湯水製エキス …… 2.0 g

ケ イ ヒ……………	2.4 g
ショウキョウ……………	0.6 g
タイソウ……………	2.4 g
カンゾウ……………	1.2 g
シャクヤク……………	3.6 g

添加物として乳糖、トウモロコシデンプンを含有する。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社
TEL 03-3834-2171

適応症

腹部膨満感のある次の諸症：
しぶり腹、腹痛

用法・用量

次の 1 回量を 1 日 3 回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人 (15 才以上)	1 包
7 才～14 才	2/3 包
4 才～ 6 才	1/2 包

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。



三和生薬株式会社
宇都宮市平出工業団地 6-1