

サンワロン K

けい し か じゅつ ぶ とう
桂枝加朮附湯 による

サンワロン K は、漢方処方「桂枝加朮附湯」の水製エキスを服用しやすい錠剤にしたものです。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
- (4) 高齢者。
- (5) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (6) 次の症状のある人。
むくみ
- (7) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
そ の 他	どうき、のぼせ、ほてり

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- (2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること

成 分

本品1日量…………… 15錠（1錠 0.3g）中

サンワロン K 水製エキス…………… 2.4g

ケ イ ヒ……………	2.4g	ショウキョウ……………	0.6g
シャクヤク……………	2.4g	カンゾウ……………	1.2g
タイソウ……………	2.4g	ソウジュツ……………	2.4g

加工ブシ末…………… 0.6g

添加物としてカルメロース Ca、メタケイ酸アルミン酸 Mg、
ステアリン酸 Ca、乳糖を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社

TEL 03-3834-2171（代）

適応症

悪感をおぼえ尿快通せず、四肢の屈伸が困難なもの。
急性および慢性関節炎、関節リウマチ、神経痛、偏頭痛

用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人（15才以上）	5錠
15才 未 満	服用しないこと



三和生薬株式会社

宇都宮市平出工業団地6-1

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果にはかわりございません。