

## サ ン ワ ロ ン K 顆 粒

けい し か じゅ つ ぶ と う

桂枝加朮附湯による

サンワロン K 顆粒は、漢方処方「桂枝加朮附湯」の水製エキスを服用しやすい顆粒の分包にしたものです。



## 使用上の注意



## 相談すること

## 1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
- (4) 高齢者。
- (5) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (6) 次の症状のある人。  
むくみ
- (7) 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病

## 2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位  | 症 状         |
|-------|-------------|
| 皮 膚   | 発疹・発赤、かゆみ   |
| そ の 他 | どうき、のぼせ、ほてり |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。  
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

| 症 状 の 名 称 | 症 状                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| 偽アルドステロン症 | 尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。 |

- (2) 1 ヶ月位服用しても症状がよくなる場合

## 3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること

## 成 分

本品 1 日量 …… 6 包（1 包 0.75 g） 中

サンワロン K 水製エキス …… 2.4 g

|          |       |                |       |
|----------|-------|----------------|-------|
| ケ イ ヒ …… | 2.4 g | シ ョ ウ キ ョ ウ …… | 0.6 g |
| シャクヤク …… | 2.4 g | カンゾウ ……        | 1.2 g |
| タイソウ ……  | 2.4 g | ソウジュツ ……       | 2.4 g |

加工ブシ末 …… 0.6 g

添加物としてトウモロコシデンプン、乳糖、ステアリン酸 Ca を含有する。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

## ● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社

TEL 03-3834-2171（代）

## 適応症

体力虚弱で、汗が出、手足が冷えてこわばり、ときに尿量が少ないものの次の諸症：

関節痛、神経痛

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果にはかわりございません。

## 用法・用量

次の 1 回量を 1 日 3 回食前又は食間に服用すること。

| 年 令        | 1 回 量   |
|------------|---------|
| 大人（15 才以上） | 1～2 包   |
| 15 才 未 満   | 服用しないこと |



三 和 生 薬 株 式 会 社

宇都宮市平出工業団地 6－1