

サンワロン K 顆粒

けい し か じゅ つ ぶ と う

桂枝加朮附湯による

サンワロン K 顆粒は、漢方処方「桂枝加朮附湯」の水製エキスを服用しやすい顆粒の分包にしたものです。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
- (4) 高齢者。
- (5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (6) 次の症状のある人。
むくみ
- (7) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
* そ の 他	動悸、のぼせ、ほてり、口唇・舌のしびれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、 脱力感、筋肉痛があらわれ、 徐々に強くなる。

3. 1 ヶ月位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

用法・用量

次の 1 回量を 1 日 3 回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人 (15 才以上)	1~2 包
15 才 未 満	服用しないこと

成 分

本品 1 日量 …………… 6 包 (1 包 0.75 g) 中

サンワロン K 水製エキス…………… 2.4 g

ケ イ ヒ……………	2.4 g	シ ョ ウ キ ョ ウ……………	0.6 g
シャクヤク……………	2.4 g	カンゾウ……………	1.2 g
タイソウ……………	2.4 g	ソウジュツ……………	2.4 g

加工ブシ末…………… 0.6 g

添加物としてトウモロコシデンプン、乳糖、ステアリン酸 Ca を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店
又は下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社 消費者くすり相談室

東京都千代田区外神田 6-6-1

T E L 03-3834-2171 (代)

(月～金曜日 10:00～17:00 但し祝日を除く)

適応症

体力虚弱で、汗が出、手足が冷えてこわばり、ときに尿量が少ないものの次の諸症：

関節痛、神経痛



三 和 生 薬 株 式 会 社

栃木県宇都宮市平出工業団地 6-1