

けいしかりゅうこつぱれいとう
サンワ 桂枝加竜骨牡蛎湯 エキス細粒「分包」

サンワ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス細粒「分包」は、漢方処方「桂枝加竜骨牡蛎湯」の水製エキスを服用しやすい細粒剤の分包にしたものです。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。
むくみ
- (6) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- (2) 1 ヶ月位（小児夜泣きに服用する場合には 1 週間位）服用しても症状がよくなる場合

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること

適応症

体質の虚弱な人で疲れやすく、興奮しやすいものの次の諸症：
神経質、不眠症、小児夜泣き、小児夜尿症、眼精疲労

用法・用量

次の 1 回量を 1 日 3 回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人（15 才以上）	1 包
7 才～14 才	2/3 包
4 才～ 6 才	1/2 包
2 才～ 3 才	1/3 包

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成 分

本品 1 日量 ……………〔3 包（1 包 2 g）〕 中
桂枝加竜骨牡蛎湯水製エキス … 2.1 g

ケ イ ヒ ……………	2.4 g
シャクヤク ……………	2.4 g
タイソウ ……………	2.4 g
ショウキョウ ……………	0.6 g
カンゾウ ……………	1.2 g
リュウコツ ……………	1.8 g
ボ レ イ ……………	1.8 g

添加物として乳糖、トウモロコシデンプンを含有する。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社
TEL 03-3834-2171



三和生薬株式会社
宇都宮市平出工業団地 6-1