

けいしかりゅうこつぼれいとう  
サンワ 桂枝加竜骨牡蛎湯 エキス細粒「分包」

サンワ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス細粒「分包」は、漢方処方「桂枝加竜骨牡蛎湯」の水製エキスを服用しやすい細粒の分包にしたものです。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 高齢者。
  - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
  - 次の症状のある人。  
むくみ
  - 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症 状       |
|------|-----------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ |

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。  
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

| 症 状 の 名 称           | 症 状                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| 偽アルドステロン症、<br>ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |

- 1 ヶ月位（小児夜泣きに服用する場合には 1 週間位）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

用法・用量

次の 1 回量を 1 日 3 回食前又は食間に服用すること。

| 年 令        | 1 回 量   |
|------------|---------|
| 大人（15 才以上） | 1 包     |
| 7 才～14 才   | 2/3 包   |
| 4 才～ 6 才   | 1/2 包   |
| 2 才～ 3 才   | 1/3 包   |
| 2 才 未 満    | 服用しないこと |

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成 分

本品 1 日量 …………… 3 包（1 包 2 g） 中  
桂枝加竜骨牡蛎湯水製エキス … 2.1 g

|                   |       |
|-------------------|-------|
| ケ イ ヒ ……………       | 2.4 g |
| シ ャ ク ヤ ク ……………   | 2.4 g |
| タ イ ソ ウ ……………     | 2.4 g |
| シ ョ ウ キ ョ ウ …………… | 0.6 g |
| カ ン ズ ウ ……………     | 1.2 g |
| リ ユ ウ コ ツ ……………   | 1.8 g |
| ポ レ イ ……………       | 1.8 g |
| ＊上記の生薬より抽出したエキス   |       |

添加物として乳糖、トウモロコシデンプンを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- ＊ 1 包を分割した残りを服用する場合には袋の口を折り返して保管し、2 日以内に服用すること。

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社 消費者くすり相談室  
東京都千代田区外神田 6-6-1  
T E L 03-3834-2171（代）  
（月～金曜日 10：00～17：00 但し祝日を除く）

適応症

体力中等度以下で、疲れやすく、神経過敏で、興奮しやすいものの次の諸症：

神経質、不眠症、小児夜泣き、夜尿症、眼精疲労、神経症

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果にはかわりございません。



三 和 生 薬 株 式 会 社  
栃木県宇都宮市平出工業団地 6-1