

ご使用に際しては、説明文書を必ずお読み下さい。  
また、必要な時に読めるように保管して下さい。

さいこかりゅうこつぽれいとう  
サンワ 柴胡加竜骨牡蛎湯 エキス細粒

サンワ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒は、漢方処方「柴胡加竜骨牡蛎湯」の水製エキスを服用しやすい細粒剤にしたものです。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

＊授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

＊(3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。

＊(4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。

(5) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

(6) 次の医薬品を服用している人。  
瀉下薬（下剤）

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位 | 症 状            |
|------|----------------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ      |
| ＊消化器 | はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。  
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

| 症状の名称  | 症 状                            |
|--------|--------------------------------|
| ＊肝機能障害 | 全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。 |
| ＊間質性肺炎 | せきを伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。      |

(2) 1 ヶ月位（小児夜なきに服用する場合には 1 週間位）服用しても症状がよくなる場合

＊ 3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること

軟便、下痢

用法・用量

次の 1 回量を 1 日 3 回食前又は食間に服用すること。

| 年 令        | 1 回 量 |
|------------|-------|
| 大人（15 才以上） | 2.0 g |
| 7 才～14 才   | 1.3 g |
| 4 才～ 6 才   | 1.0 g |
| 2 才～ 3 才   | 0.6 g |

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成 分

本品 1 日量 …………… 6 g 中  
柴胡加竜骨牡蛎湯水製エキス …… 1.9 g

|            |       |            |       |
|------------|-------|------------|-------|
| サイコ ……………  | 3.0 g | ショウキョウ ……  | 0.5 g |
| ハンゲ ……………  | 2.4 g | ニンジン …………… | 1.5 g |
| ブクリョウ ………  | 1.8 g | リュウコツ ………  | 1.5 g |
| ケイヒ ……………  | 1.8 g | ボレイ ……………  | 1.5 g |
| オウゴン …………… | 1.5 g | ダイオウ …………… | 0.6 g |
| タイソウ …………… | 1.5 g |            |       |

添加物として乳糖、トウモロコシデンプンを含有する。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社

TEL 03-3834-2171

適応症

精神不安があつて、どうき、不眠などを伴う次の諸症：  
高血圧の随伴症状（どうき、不安、不眠）、神経症、  
更年期神経症、小児夜なき。



三和生薬株式会社

宇都宮市平出工業団地 6-1