

さん そう にん どう
サンワ 酸棗仁湯 エキス錠

サンワ酸棗仁湯エキス錠は、漢方処方「酸棗仁湯」の水製エキスを服用しやすい錠剤にしたものです。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 胃腸の弱い人。
- (4) 下痢又は下痢傾向のある人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消 化 器	悪心、食欲不振、胃部不快感

- (2) 1 週間位服用しても症状がよくならない場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること

ド 痢

成 分

本品 1 日量 …… 18 錠（1 錠 0.3 g）中
酸棗仁湯水製エキス …… 1.9 g

チ	モ	2.4 g
セン	キュウ	2.4 g
ブ	クリョウ	4.0 g
カン	ゾウ	0.8 g
サン	ソウニン	8.0 g

添加物として乳糖、トウモロコシデンプン、メタケイ酸アルミン酸 Mg、ステアリン酸 Ca を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

適応症

体力中等度以下で、心身が疲れ、精神不安、不眠などがあるものの次の諸症：

不眠症、神経症

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社

TEL 03-3834-2171（代）

用法・用量

次の 1 回量を 1 日 3 回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人（15 才以上）	6 錠
7 才～14 才	4 錠
5 才～6 才	3 錠
5 才 未 満	服用しないこと

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果にはかわりございません。



三 和 生 薬 株 式 会 社

宇都宮市平出工業団地 6-1