

ご使用に際しては、説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるように保管して下さい。

サンワ し もつ とう 四物湯 エキス細粒

サンワ四物湯エキス細粒は、漢方処方「四物湯」の水製エキスを服用しやすい細粒剤にしたものです。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- * (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
- (4) 胃腸の弱い人。
- (5) 下痢しやすい人。
- (6) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消 化 器	胃部不快感、食欲不振、腹痛
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 1 ヶ月位服用しても症状がよくなる場合

- * 3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること
- 下 痢

成 分

本品 1 日量 6 g 中
四物湯水製エキス 1.8 g

トウキ	3 g
センキュウ	3 g
シャクヤク	3 g
ジオウ	3 g

添加物として乳糖，トウモロコシデンプンを含有する。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社
TEL 03-3834-2171

適応症

皮膚が乾燥し、色つやの悪い体質で胃腸障害のない人の次の諸症：

産後あるいは流産後の疲労回復，月経不順，冷え症，しもやけ，しみ，血の道症

用法・用量

次の 1 回量を 1 日 3 回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人（15 才以上）	2.0 g
7 才～14 才	1.3 g
4 才～ 6 才	1.0 g

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。



三和生薬株式会社
宇都宮市平出工業団地 6-1