2009年10月改訂（第2版）

第2類医薬品

ご使用に際しては，説明文書を必ずお読み下さい。
また，必要な時に読めるように保管して下さい。

品番 147

サンワ　四物湯（しもつとう）　エキス細粒「分包」

サンワ四物湯エキス細粒「分包」は，漢方処方「四物湯」の水製エキスを服用しやすい細粒の「分包」にしたものです。

使用上の注意

相談すること

1．次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人，体の弱い人）。
(4) 胃腸の弱い人。
(5) 下痢しやすい人。
(6) 今までに薬により発疹・発赤，かゆみ等を起こしたことがある人。

2．次の場合は，直ちに服用を中止し，この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1) 服用後，次の症状があらわれた場合

関係部位	症　状
皮　ふ	発疹・発赤，かゆみ
消化器	胃部不快感，食欲不振，腹痛

(2) 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合

3．次の症状があらわれることがあるので，このような症状の継続又は増強が見られた場合には，服用を中止し，医師又は薬剤師に相談すること

下痢

適応症

体力虚弱で，冷え症で皮膚が乾燥，色つやの悪い体質で胃腸障害のないものの次の諸症：

月経不順，月経異常，更年期障害，血の道症[注]，冷え症，しもやけ，しみ，貧血，産後あるいは流産後の疲労回復

〈適応症に関連する注意〉

注）：血の道症とは，月経，妊娠，出産，産後，更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。

用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用すること。

年　令	1回量
大人（15才以上）	1包
7才～14才	2/3包
4才～6才	1/2包
4才未満	服用しないこと

小児に服用させる場合には，保護者の指導監督のもとに服用させること。

成　分

本品1日量 …… 3包（1包 2g）中
四物湯水製エキス …… 1.8g

トウキ ……	3g
センキュウ ……	3g
シャクヤク ……	3g
ジオウ ……	3g

添加物として乳糖，トウモロコシデンプンを含有する。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない，湿気の少ない涼しい所に保管すること。
(2) 小児の手の届かない所に保管すること。
(3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは，お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社
TEL　03-3834-2171（代）

本剤は，生薬を使用しておりますので，製品により多少色が異なることもございますが，効能・効果にはかわりございません。

三和生薬株式会社
宇都宮市平出工業団地6－1