


しゃくやくかん ぞうとう
サンワ 芍薬甘草湯 エキス錠

サンワ芍薬甘草湯エキス錠は、漢方処方「芍薬甘草湯」の水製エキスを服用しやすい錠剤にしたものです。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

1. 次の人は服用しないこと

次の診断を受けた人。
心臓病

2. 症状があるときのみの服用にとどめ、連用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 次の症状のある人。
むくみ
- (5) 次の診断を受けた人。
高血圧、腎臓病

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1) まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。
うっ血性心不全、心室頻拍	全身のだるさ、動悸、息切れ、胸部の不快感、胸が痛む、めまい、失神等があらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。

(2) 5～6回服用しても症状がよくならない場合

用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人（15才以上）	6錠
7才～14才	4錠
5才～6才	3錠
5才未満	服用しないこと

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成 分

本品1日量 …… 18錠（1錠 0.3g）中
芍薬甘草湯水製エキス …… 1.0g

シャクヤク	3.0g
カンゾウ	3.0g

添加物として乳糖、トウモロコシデンプン、メタケイ酸アルミン酸Mg、ステアリン酸Caを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

● お問い合わせ先

本品の内容についての問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社
TEL 03-3834-2171（代）

適応症

体力に関わらず使用でき、筋肉の急激なけいれんを伴う痛みのあるものの次の諸症：

こむらがえり、筋肉のけいれん、腹痛、腰痛

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果にはかわりございません。



三和生薬株式会社
宇都宮市平出工業団地6-1