

しょうはんげかぶくりょうとう
サンワ 小半夏加茯苓湯 エキス細粒「分包」

サンワ小半夏加茯苓湯エキス細粒「分包」は、漢方処方「小半夏加茯苓湯」の水製エキスを服用しやすい細粒の分包にしたものです。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

成 分

本品 1 日量 …………… 3 包（1 包 2 g）中
 小半夏加茯苓湯水製エキス …… 1.4 g

〔 ハ ン ゲ …………… 8.0 g
 ショウキョウ …………… 1.5 g
 ブクリョウ …………… 5.0 g 〕

添加物として乳糖、トウモロコシデンプンを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社 消費者くすり相談室

東京都千代田区外神田 6-6-1

T E L 03-3834-2171（代）

（月～金曜日 10：00～17：00 但し祝日を除く）

適応症

体力に関わらず使用でき、悪心があり、ときに嘔吐するものの次の諸症：

つわり、嘔吐、悪心、胃炎

用法・用量

次の 1 回量を 1 日 3 回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人（15才以上）	1 包
7才～14才	2/3 包
4才～ 6才	1/2 包
4才 未 満	服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果にはかわりございません。



三 和 生 薬 株 式 会 社

栃木県宇都宮市平出工業団地 6-1